

中国科学技术大学


2002—2003 学年第二学期考试试卷

考试科目： 概率论与数理统计 得分： _____

学生所在系： _____ 姓名 _____ 学号： _____

(考期：2003 年 6 月 30 日，闭卷，可用计算器)

一、考虑如图所示的电路图：



其中开关 A、B、C、D、E 是独立工作的，每个开关以概率 p 开着，以概率 $q=1-p$ 关着，求一个输入的信号在输出处被接收到的概率；如果一个信号被接收到，那么开关 E 是开着的条件概率是多少？

二、设 (X, Y) 的联合密度函数为：

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & |y| < x, 0 < x < 1; \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

求 (1) 常数 C 的值；(2) 条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 及 $f_{Y|X}(y|x)$ ；(3) 讨论 X 与 Y 的独立性和相关性。

三、在一家保险公司里有 10000 个人参加保险，每人每年付 12 元保险费，在一年内一个人死亡的概率为 0.006，死亡时其家属可向保险公司领取 1000 元的保险金，问：

- (1) 保险公司亏本的概率多大？
- (2) 保险公司一年的利润不少于 40000 元、60000 元的概率各多大？

四、设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从总体 X 中抽取的一个简单随机样本，已知 X 的概率密度函数为：

$$f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x > \theta; \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数， $-\infty < \theta < \infty$ 。

- (1) 试求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$ 和矩估计 $\tilde{\theta}$ ；
- (2) 求常数 c_1 和 c_2 ，使得 $c_1 \hat{\theta} - c_2$ 为 θ 的无偏估计；
- (3) 求常数 c_3 和 c_4 ，使得 $c_3 \tilde{\theta} - c_4$ 为 θ 的无偏估计；
- (4) 在均方误差意义下比较这两个无偏估计哪个更优。(注：上述常数可与 n 有关)

五、据信有一种疾病会导致病人的白细胞数目较常人少，假设正常人白细胞数服从均值为 7250 (单位：个/立方毫米，下同) 的正态分布，现有 16 个病人，其白细胞的样本均值为 4767，样本标准差为 3204，根据这批数据能否认为这种疾病使白细胞数

目减少? (显著性水平为 $\alpha = 0.05$)

自由度为 n 的 t 分布的 p 分位数表

$n \backslash p$	0.90	0.95	0.975	0.99
15	1.341	1.753	2.131	2.602
16	1.337	1.746	2.120	2.583

六、在 $[0,1]$ 区间上随机独立地投掷两点, 设 X 与 Y 分别表示这两点的坐标, 试求这两点间距离的概率密度函数、数学期望和方差。

中国科学技术大学

2003—2004 学年第一学期考试试卷

考试科目：概率论与数理统计 得分：_____

学生所在系：_____姓 名_____学 号：_____

(考期：2004 年 1 月 8 日，闭卷，可用计算器)

一、甲、乙、丙三人独立地向靶子各射击一次，其命中率分别为 0.6、0.5 和 0.4. 现已知恰有两人命中靶子，问：

- (1) 此两人中包括丙的可能性大，还是不包括丙的可能性大？
- (2) 此两人中包括乙的可能性大，还是包括丙的可能性大？(要求写出计算过程)

二、某种商品一周的需求量是个随机变量，其概率密度为：

$$f(t) = \begin{cases} te^{-t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

每周的需求量相互独立，试求：

- (1) 两周需求量的概率密度；
- (2) 三周需求量的概率密度。

三、利用中心极限定理求解：

- (1) 设计计算机在进行加法运算时，每次取整的误差相互独立，且服从 $[-0.5, 0.5]$ 上的均匀分布，若要保证误差总和的绝对值不超过 20 的概率大于或者等于 0.95，问至多只能进行多少次加法运算？
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} e^{-n} = ?$

四、设样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 抽自总体 $X \sim f(x; \theta)$ ，其中：

$$f(x; \theta) = \frac{1}{2} e^{-\frac{x-\theta}{2}}, (x > \theta; \theta \in R)$$

- (1) 试求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$ 和极大似然估计 θ^* ；
- (2) 验证 $\hat{\theta}$ 和 θ^* 是否为 θ 的无偏估计，若不是无偏估计，试将其分别修正为无偏估计 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ ；
- (3) 比较 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 何者为优？

五、为考察钢铁工人和电厂工人平均工资的差别，从两厂各抽取若干工人调查，结果如下：

钢厂：74, 65, 72, 69 (元)

电厂：75, 78, 74, 76, 72 (元)

若钢厂工人与电厂工人工资分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 与 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，总体独立且均值方差未知，试据上述数据判断：

- (1) 是否可以认为 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$? ($\alpha = 0.05$)
- (2) 钢铁工人平均工资是否低于电厂工人平均工资? ($\alpha = 0.05$)

中国科学技术大学

2003—2004 学年第二学期考试试卷

考试科目：概率论与数理统计 得分：_____

学生所在系：_____姓 名_____学 号：_____

(考期：2004 年 6 月 25 日，闭卷，可用计算器)

一、判断和填空：

- (1) 设 $P(A)=0$ ，则 A 为不可能事件。
- (2) 设 (X,Y) 服从二元正态， $\text{Cov}(X,Y)=0$ ，则 X 、 Y 相互独立。
- (3) 设 X 、 Y 相互独立，则 X 、 Y 的联合分布可以由 X 和 Y 的边缘分布唯一确定。
- (4) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为从同一个总体中抽取的一个样本，则 $\max(X_1, \dots, X_n) - \min(X_1, \dots, X_n) + 3$ 是统计量。
- (5) 设 $\theta > 0$ ， X 的概率分布函数为：

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \exp\left\{-\frac{x-\mu}{\theta}\right\}, & x \geq \mu \\ 0, & x < \mu \end{cases}$$

则随机变量 X 的密度函数为 ()。

- (6) 设 X 、 Y 服从单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上的均匀分布，则在给定 $Y=0.5$ 条件下的 X 的条件密度函数为 ()。
- (7) 设 X 和 Y 相互独立，它们的均值全为 0，方差全为 1，记 $V=X-Y$ ，则 X 与 V 的相关系数为 ()。

二、求：(1) $P(Y=2|X=1)$ ；(2) $X^2 + Y^2$ 的分布，其中 X 、 Y 的联合分布如下：

$X \backslash Y$	-1	0	1	2
-1	0.12	0.08	0.30	0.15
1	0.08	0.22	0	0.05

三、设 X 服从期望为 2 的指数分布， Y 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布，且 X 与 Y 相互独立，求：(1) $X-Y$ 的概率密度函数；(2) $P(X<Y)$ 。

四、桌上有三个盒子，在甲盒中装有 2 支红芯圆珠笔，4 支蓝芯圆珠笔，乙盒中装有 4 支红芯圆珠笔，2 支蓝芯圆珠笔，丙盒中装有 3 支红芯圆珠笔，3 支蓝芯圆珠笔，今从三个盒子中任取一支笔，设甲乙丙三盒取笔的概率相等。试求：

- (1) 取得红笔的概率；
- (2) 在已知取得红笔的条件下，问笔从哪个盒子中取出的概率最大？

五、某工厂生产线甲根据专利生产灯泡，生产线乙根据本厂原有技术生产。现分别在生产线甲和乙两条生产线各抽取 8 个灯泡，测得其寿命分别为 (千小时)：

对生产线甲：10, 9, 3, 11, 5, 7, 9, 11；

对生产线乙：4, 9, 6, 5, 3, 5, 7, 7；

设灯泡寿命服从正态分布，且方差相等。试分别在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 和 $\alpha = 0.01$ 下检验生产线甲的灯泡是否比生产线乙生产的寿命要长。

六、设总体 X 服从 $(1, \theta + 1)$ 上的均匀分布, $X_1, \dots, X_n$ 为总体 X 中抽取的一个样本。试求:

(1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和极大似然估计 $\hat{\theta}_2$;

(2) $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的无偏估计, 若不是, 请加以修正;

(3) $\hat{\theta}_3 = 2\hat{\theta}_4 - 2$ 是 θ 的无偏估计, 其中 $\hat{\theta}_4 = \frac{2X_1 + X_2 + \dots + X_{n-1} + 2X_n}{n+2}$, 问 $\hat{\theta}_1$ 的修正 (如果需要修正的话) 和 $\hat{\theta}_3$ 哪个更有效?

中国科学技术大学

2004—2005 学年第一学期考试试卷

考试科目： 概率论与数理统计 得分： _____

学生所在系： _____ 姓 名 _____ 学 号： _____

(考期：2005 年 1 月 20 日，闭卷，可用计算器)

一、甲、乙、丙三门火炮同时独立地向目标射击，其命中率分别为 0.2, 0.3 和 0.5。目标被命中一发而被摧毁的概率为 0.2，被命中两发而被摧毁的概率为 0.6，被命中三发而被摧毁的概率 0.9，试求：

- (1) 三门火炮在一次射击中摧毁目标的概率；
- (2) 在目标被摧毁的条件下，其只由甲火炮击中的概率。

二、设 X 与 Y 独立同分布，都服从参数为 λ 的指数分布，试求 Z 的分布密度，其中：

- (1) $Z=\min\{X,Y\}$ ；
- (2) $Z=X+Y$ 。

三、将一枚骰子独立地投掷 n 次，令 X 与 Y 分别表示其 1 点出现的次数和 6 点出现的次数，并记 $Z=n-X$ 。试求：

- (1) X 与 Y 的协方差及相关系数；
- (2) X 与 Z 的相关系数。

四、设样本 $X_1, \dots, X_n$ 抽自总体 X ，总体的密度为：

$$X \sim f(x; \theta_1) = \begin{cases} \frac{1}{\theta_2} e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}, & x \geq \theta_1 \\ 0, & x < \theta_1 \end{cases}, \text{ 其中 } \theta_1 \in R \text{ 为未知参数, } \theta_2 > 0 \text{ 为已知数。}$$

- (1) 求 θ_1 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和极大似然估计 θ_1^* ；
- (2) $\hat{\theta}_1$ 和 θ_1^* 是否为 θ_1 的无偏估计？是加以证明，不是请加以修正为无偏估计量。

五、某校组织学生参加英文词汇训练，并在年初与年底（即训练前与训后）各举行一次阅读考试，以考察训练的效果。现随机抽取 10 名同学，将其年初与年底的考试成绩记录如下：

学生	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
年初成绩	64	43	84	72	52	93	77	58	69	91
年底成绩	72	50	86	80	50	90	78	57	72	95

假定两次考分之差服从正态分布，试由此判断词汇训练是否有显著效果？（分别在 $\alpha = 0.05$ 与 $\alpha = 0.01$ 的水平下检验）

六、为了研究色盲是否与性别有关，随机抽取 1000 人进行调查，结果如下：

	男	女	和
正常	442	514	956

色盲	38	6	44
和	480	520	1000

- (1) 试据此判断，色盲是否与性别有关？($\alpha = 0.01$)
- (2) 你认为是男性还是女性更容易患色盲？请说明理由。

中国科学技术大学

2005—2006 学年第一学期考试试卷

考试科目： 概率论与数理统计 得分： _____

学生所在系： _____ 姓 名 _____ 学 号： _____

(考期：2006 年 1 月 22 日，闭卷，可用计算器)

一、设昆虫产卵个数服从参数为 λ 的 Poisson 分布，而每个卵孵化成幼虫的概率为 p ，且各卵是否成虫彼此之间没有关系。试求：

- (1) 一个昆虫产生 k 个后代的概率；
- (2) 若某个昆虫产生 k 个后代，求它产生 m 个卵的概率。

二、设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度为：

$$f(x,y) = \begin{cases} 0.25(1+xy), & |x| < 1, |y| < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

- (1) 求给定 $X=1/2$ 时 Y 的条件概率密度；
- (2) 求 $\text{Cov}(X,Y)$ 和 $\text{Var}(Y|X=1/2)$ ；
- (3) 证明 X^2 与 Y^2 独立。

三、设某学校有 5000 名学生，在某一时间区间内每个学生去某个阅览室的概率为 0.05，且设每个学生是否去该阅览室是相互独立的。试问该阅览室至少需要设多少座位才能以 95%的概率保证每个到该阅览室来的同学均有座位？

四、设从总体

X	0	1	2	3
P	$\theta/2$	θ	$3\theta/2$	$1-3\theta$

抽取的一个简单随机样本 $X_1, \dots, X_{10}$ 的观测值为(0,3,1,1,0,2,0,0,3,0)。

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 和极大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ ；
- (2) 证明上述估计量都是无偏估计量；
- (3) 比较这两个估计量，指出哪个更有效。

五、假设某台精盐包装机生产的袋装盐的净重服从正态分布，按照要求每袋盐的标准重量为 500g，标准差不得超过 10g。某天开工后，从装好的盐中随机抽取 10 袋，测得其净重（单位：g）为：510, 495, 478, 487, 501, 493, 528, 504, 503, 504。试据此判断这时机器的工作是否正常。（ $\alpha = 0.05$ ）

六、在著名的豌豆实验中，孟德尔（1822-1884）同时考虑豌豆的颜色和形状，共有四种组合：（黄、圆），（黄、皱），（绿、圆），（绿、皱）。按孟德尔的理论，这四类应该有 9：3：3：1 的比例。在一次实验中，发现这四类的观察数分别为 315，101，108 和 32。试据此判断孟德尔的理论是否正确？（ $\alpha = 0.05$ ）

中国科学技术大学

2005—2006 学年第二学期考试试卷

考试科目：概率论与数理统计 得分：_____

学生所在系：_____姓 名_____学 号：_____

(考期：2006 年 7 月 3 日，闭卷，可用计算器)

一、在空战中甲机先向乙机开火，击落乙机的概率为 0.2；若乙机未被击落，就进行还击，击落甲机的概率为 0.3；若甲机未被击落，则再进攻乙机，击落乙机的概率为 0.4.试求在这三回合中：

- (1) 乙机被击落的概率是多少？
- (2) 若乙机被击落，则它在第一回合中被击落的概率是多少？

二、设 $X_1 \sim \begin{pmatrix} -1, & 0, & 1 \\ 0.25, & 0.5, & 0.25 \end{pmatrix}$, $X_2 \sim \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 0.5, & 0.5 \end{pmatrix}$, 且 $P\{X_1 X_2 = 0\} = 1$. 试求：

- (1) 试求 (X_1, X_2) 的分布；
- (2) X_1 与 X_2 是否独立？为什么？
- (3) X_1 与 X_2 是否不相关？为什么？

三、设 X 与 Y 相互独立，都服从指数分布，参数分别为 λ 与 $\mu (\lambda \neq \mu)$ ，试求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$ ，其中：(1) $Z=X+Y$ ；(2) $Z=X-Y$ 。

四、设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自总体 X ， X 服从 $(\theta, \theta + 1)$ 上的均匀分布：

- (1) 试求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$ 和极大似然估计 θ^* ；
- (2) 证明 $\hat{\theta}_1 = \bar{X} - \frac{1}{2}$ 与 $\hat{\theta}_2 = X_{(n)} - \frac{n}{n+1}$ 均为 θ 的无偏估计；
- (3) $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 哪个更有效？

五、设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ，问在下列三个统计量中：

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_3^2 = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

谁是 σ^2 的无偏估计？谁对 σ^2 的均方误差 $E(S_i^2 - \sigma^2)^2$ 最小？请证明你的结论。

六、某校组织学生参加英文词汇训练，并在年初与年底（即训练前与训后）各举行一次阅读考试，以考察训练的效果。现随机抽取 10 名同学，将其年初与年底的考试成绩记录如下：

- (1) 假定两次考分之差服从正态分布，试由此判断词汇训练是否有显著效果？（在 $\alpha = 0.05$ 的水平下检验）
- (2) 若上述两组数据并非取自相同的 10 名同学，而是分别从两次考分中各随机抽取 10

人，并假定两次考分分别服从正态分布（二总体独立），方差未知但相等，试据以判断词汇训练是否有显著效果？（在 $\alpha = 0.05$ 的水平下检验）

学生	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
年初成绩	64	43	84	72	52	93	77	58	69	91
年底成绩	72	50	86	80	50	90	78	57	72	95

参考答案

一、（1） $0.2+0.8*0.7*0.4=0.424$

（2） $0.2/0.424=0.472$

二、（1）略；（2）不独立；（3）不相关

三、（1） $f_Z(z) = \frac{\lambda\mu}{\lambda-\mu}(e^{-\mu z} - e^{-\lambda z}), z \geq 0;$

$$(2) f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda\mu}{\lambda+\mu} e^{-\lambda z}, & z \geq 0 \\ \frac{\lambda\mu}{\lambda+\mu} e^{\mu z}, & z < 0 \end{cases}$$

四、（1） $\hat{\theta} = \bar{X} - \frac{1}{2} \quad \theta^* \in [X_{(n)} - 1, X_{(1)}]$

（2）略

（3） $\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{12n} \quad \text{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \quad n \leq 7, \hat{\theta}_1 \text{有效}; n \geq 8, \hat{\theta}_2 \text{有效}$

五、（1） $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为无偏估计量；（2）均方误差排序 $S_3^2 < S_2^2 < S_1^2$

六、（1）成对数据检验，拒绝原假设；（2）两样本t检验，无法拒绝原假设。

中国科学技术大学

2006—2007 学年第一学期考试试卷

考试科目： 概率论与数理统计 得分： _____

学生所在系： _____ 姓 名 _____ 学 号： _____

(考期：2007 年 1 月 31 日，闭卷，可用计算器)

一、有 12 个新的乒乓球，每次比赛时取出 3 个，用完之后再放回去。

(1) 设第二次比赛时取到 X 个新球，试求 X 的分布律；

(2) 若第三次比赛时取到 3 个新球，问第二次比赛时取出的 3 个球都是新球的概率是多少？

二、设 X 与 Y 独立，都服从指数分布，参数分别为 λ 与 $\mu (\lambda \neq \mu)$ ，试求 $Z=X+Y$ 的分布密度 $f_Z(z)$ 。

三、设 Y 服从参数为 μ 与 σ^2 的对数正态分布 (即 Y 满足： $\ln Y \sim N(\mu, \sigma^2)$)，试求 Y 的分布密度 $f_Y(y)$ 及 $E(Y)$ 与 $\text{Var}(Y)$ 。

四、某蛋糕店出售三种生日蛋糕，单价分别为 12 元、20 元和 40 元，售出这三种蛋糕的概率分别为 0.3, 0.2 和 0.5。某日该店售出 300 个蛋糕，问：

(1) 该日总收入超过 8000 元的概率约为多少？

(2) 该日售出单价为 20 元的蛋糕超过 60 的概率约为多少？

五、设样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自总体 X ，其中：

$$X \sim f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x-\theta}{2}}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$$

(1) 试求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$ 和极大似然估计 θ^* ；

(2) 验证 $\hat{\theta}$ 和 θ^* 是否为 θ 的无偏估计；若否，试将其修正为无偏估计。

六、假设某台精盐包装机生产的袋装盐的净重服从正态分布，按照要求每袋盐的标准重量为 500g，标准差不得超过 10g。某天开工后，从装好的盐中随机抽取 10 袋，测得其净重 (单位：g) 为：510, 495, 478, 487, 501, 493, 528, 504, 503, 504。

试据此判断这时机器的工作是否正常。 ($\alpha = 0.05$)

七、某一作业中可能发生两类事故：A (起火) 和 B (爆炸)，而该作业有三种不同的原料可供选择：L、M 和 N。下面给出的是事故记录：

	L	M	N	和
A	42	17	29	88
B	20	4	29	53
和	62	21	58	141

试据此判断事故类型是否与原料的种类有关？ ($\alpha = 0.05$)

参考答案

一、(1) $P(X = k) = \frac{\binom{9}{k}\binom{3}{3-k}}{\binom{12}{3}}, k=0,1,2,3$

(2) Bayes formula = 0.23

二、 $f_Z(z) = \frac{\lambda\mu}{\lambda-\mu}(e^{-\mu z} - e^{-\lambda z}), z > 0$

三、 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}, y > 0$ $E(Y) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$ $\text{Var}(Y) = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu + \sigma^2}$

四、(1) $E(X) = 27.6$ $\text{Var}(X) = 161.44$ $P(\sum_{i=1}^{300} X_i > 8000) \approx \Phi(1.27)$

(2) $Y \sim B(300, 0.2)$ $P(Y > 60) \approx 0.5$

五、(1) $\hat{\theta} = \bar{X} - 2$ $\theta^* = X_{(1)}$

(2) $E\hat{\theta} = \theta$ $E\theta^* = \theta + \frac{2}{n}$ 有偏, 修正为 $\tilde{\theta} = X_{(1)} - \frac{2}{n}$

中国科学技术大学

2006—2007 学年第二学期考试试卷

考试科目: 概率论与数理统计 得分: _____

学生所在系: _____ 姓名 _____ 学号: _____

(考期: 2007 年 7 月 13 日, 闭卷, 可用计算器)

一、(18 分)

(1) 举例说明: 一般而言, $P(B|A) + P(B|\bar{A}) = 1$ 和 $P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$ 不成立;

(2) 举例说明: 随机变量 X 与 Y 不独立, 但 X^2 和 Y^2 独立;

(3) 设 A_1, A_2, A_3, A_4 相互独立, 且 $P(A_i) = \frac{1}{3}$, ($i = 1, 2, 3, 4$) 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^4 A_i\right) = (\quad);$$

(4) 设随机变量 X 与 Y 独立, 且 $E(X) = E(Y) = 0, \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1$ 。若命

$W = X - Y$, 则 Y 与 W 的相关系数是 ();

(5) 判断正误: 设 X 与 Y 都是正态随机变量, 则 X 与 Y 的联合分布由 X 与 Y 的边缘分布唯一确定 ();

(6) 判断正误: 在假设检验中, 我们要检验两个正态总体均值差 $\mu_1 - \mu_2 = \delta$ 是否为

零, 则 $\bar{X} - \bar{Y} - \delta$ 是统计量 ()。

二、(10 分) 有 100 个零件, 其中 90 个为一等品, 10 个为二等品。从中随机取出 2 个, 安装在一台设备上。若 2 个零件中恰有 k 个二等品 ($k = 0, 1, 2$), 则该设备的使用寿命服从参数为 $\lambda = k + 1$ 的指数分布。若已知该设备寿命超过 1, 试求安装的 2 个零件均为一等品的概率。

三、(20 分) 设 $r.v. X \sim f(x) = 6x(1-x)$, ($0 \leq x \leq 1$)

(1) 验证 $f(x)$ 是概率密度函数并画出其图形;

(2) 求出 X 的概率分布函数;

(3) 确定满足 $P(X < b) = P(X > 3b/2)$ 的数 b , ($0 < b < 1$);

(4) 计算 $P\{X \leq \frac{1}{2} | \frac{1}{3} < X < \frac{2}{3}\}$ 。

四、(7 分) 设 (X, Y) 服从 $D = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的均匀分布, 试求

$Z = \frac{Y}{3X}$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

五、(30 分) 设样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 抽自总体 X , X 服从三点分布:

$$P(X = -1) = p, P(X = 0) = 1 - 3p, P(X = 1) = 2p$$

- (1) 试分别用样本一阶和二阶原点矩来估计未知参数 p ;
- (2) 证明这两个估计都是无偏估计;
- (3) 问这两个无偏估计, 哪个更有效 (即哪个方差更小)?

六、(15 分) 为了解甲、乙二企业职工工资水平, 分别从二企业各随机抽取若干名职工调查, 得如下数据 (单位: 元):

甲企业: 750, 1060, 750, 1820, 1140, 1050, 1000

乙企业: 1000, 1900, 900, 1800, 1200, 1700, 1950, 1200

设二企业职工工资分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$, 二总体独立且均值、方差皆未知。试根据以上数据判断: 甲企业职工平均工资是否低于乙企业职工平均工资? (分别在 $\alpha = 0.05$ 和 $\alpha = 0.01$ 两种水平下检验)

(完)

(参考数据: t 分布上侧分位点 $t_\alpha(n)$

$\alpha \backslash n$	13	14	15
0.005	3.0123	2.9769	2.9467
0.01	2.6503	2.6245	2.6025
0.025	2.1604	2.1448	2.1315
0.05	1.7709	1.7613	1.7531

)

概率统计期末考题解答与评分标准

(2007 年 7 月 13 日考试)

一、(18 分)

(1) 例如取: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{3, 5\}$;

(2) 如: $P\{X = -1\} = 1 - p$, $P\{X = 1\} = p$, $0 < p < 1$, Y 为任意随机变量;

(3) $P(\bigcup_{i=1}^4 A_i) = 1 - P(\bigcap_{i=1}^4 \overline{A_i}) = 1 - (2/3)^4 = 65/81$;

(4) $-1/2$; (5) 误; (6) 误。

二、(10 分) $89e^2 / (89e^2 + 20e + 1)$ 。

三、(20 分):

(1) $\int_0^1 6x(1-x)dx = 1$; (2) $F(x) = \begin{cases} 1, & x > 1 \\ 3x^2 - 2x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$; (3) $b = 2/5$; (4) $1/2$ 。

四、(7 分):

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1/(12z^2), & |z| > 1/3 \\ 3/4, & |z| \leq 1/3 \end{cases}。$$

五、(30 分):

(1) $\hat{p}_1 = \bar{X}$, $\hat{p}_2 = (1/3)\bar{X}^2$; (2) $E(\hat{p}_1) = E(\hat{p}_2) = p$;

(3) $Var(\hat{p}_1) = \frac{p(3-p)}{n}$, $Var(\hat{p}_2) = \frac{p(1/3-p)}{n}$, ($0 < p < 1/3$), 故 $\hat{p}_2$ 更有效。

六、(15 分):

$H_0: \mu_1 \geq \mu_2 \Leftrightarrow H_1: \mu_1 < \mu_2$, 算得: $\bar{x} \approx 1081.43$, $\bar{y} = 1456.25$, $S_T \approx 396.5111$, 代入计算统计量值得:

$$\frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_T \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \approx -1.8265 < -1.7709 = -t_{0.05}(13), \text{拒绝 } H_0;$$

$$\frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_T \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \approx -1.8265 > -2.6503 = -t_{0.01}(13), \text{无法拒绝 } H_0。$$

中国科学技术大学

2007—2008 学年第一学期考试试卷

考试科目：概率论与数理统计 得分：_____

学生所在系：_____姓 名_____学 号：_____

(考期：2008 年 1 月 22 日，闭卷，可用计算器)

一、(15 分) 一串 0,1 数字 (独立同分布) 组成的序列中 1 的概率 p 代表了某种有用的信息, 由于某种原因需要对其保密. 现对该串数字进行随机加密, 对序列中的每一个数字抛一枚硬币 (每次正面出现的概率为 π), 若抛出的为正面, 则原序列的数字不变, 若抛出的为反面, 则原序列中相应的数字由 x 变成 $1-x$ (即 0 变成 1, 1 变成 0). 加密后的序列可以公布, 其中 1 的概率 p^* 可以估计出来. 若知道 π 的值, 就可以从加密后的序列中的 1 的频率为 p^* 计算出原序列的 p , 所以 π 称为 “密钥”.

(1) 现已知 $p^* = 0.7$, 如果 “密钥” $\pi = 0.4$, 试求 p ;

(2) 试说明为什么均匀硬币 ($\pi = 0.5$) 不适合用来加密.

二、(15 分) 设随机变量 X 满足: $|X| \leq 1$, $P(X = -1) = 1/8$, $P(X = 1) = 1/4$, 而且, X 在 $(-1, 1)$ 内任一子区间上取值的概率与该子区间的长度成正比. 试求:

(1) X 的概率分布函数 $F(x) = P(X \leq x)$;

(2) X 取负值的概率; (3) X 的数学期望 $E(X)$ 。

三、(20 分) 二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(3x+4y)}, & (x > 0, y > 0) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 试求系数 $A = ?$; (2) X 与 Y 是否独立?

(3) 试求 $Z = X + Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$;

(4) 试求 $Var(X | X + Y = 1)$ 。

四、(20 分) 设样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 取自正态总体 $X \sim N(\mu, 1)$, μ 为未知参数

(1) 试求 $\theta = P(X \geq 2)$ 的极大似然估计 θ^* (结果可用 $\Phi(\cdot)$ 的形式表示);

(2) 写出 μ 的 $(1-\alpha)$ 置信区间, 并求 θ 的 $(1-\alpha)$ 置信区间。

五、(15 分) 为考查 A, B 两种制鞋材料的耐磨性, 用它们制作了 10 双鞋, 其中每双鞋的两只鞋分别用 A 和 B 两种材料制作(左、右脚两只鞋随机地采用 A 或 B)。10 个男孩试穿这 10 双鞋之后的磨损情况如下表所示 (数字代表磨损程度), 假定 A, B 两组数据的差服从正态分布, 问是否可以认为这两种材料的耐磨性无显著差异? ($\alpha = 0.05$)

男孩	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	13.2	8.2	10.9	14.3	10.7	6.6	9.5	10.8	8.8	13.3
B	14.0	8.8	11.2	14.2	11.8	6.4	9.8	11.3	9.3	13.6
差	-0.8	-0.6	-0.3	0.1	-1.1	0.2	-0.3	-0.5	-0.5	-0.3

六、(15 分) 投资者感兴趣的一个问题, 是上市公司股票价格的变化与其公司总部所在地是否有关。下表给出的是美国两个不同地区 (公司总部所在地) 的上市公司在 1998 年第三季度内股价变化情况。表格内的数字是相应的上市公司的个数。问股票价格的变化是否存在地区间的差异? ($\alpha = 0.05$)

股价变化 总部所在地	上升	不变	下降
	100	7	561
新英格兰地区	88	10	370
西北地区			

(完)

(参考数值: $\chi_{0.025}^2(2) = 7.3778$; $\chi_{0.05}^2(2) = 5.9915$;

$\chi_{0.025}^2(6) = 14.4494$; $\chi_{0.05}^2(6) = 12.5916$; $t_{0.025}(9) = 2.2622$;

$t_{0.05}(9) = 1.8331$; $t_{0.025}(10) = 2.2281$; $t_{0.05}(10) = 1.8125$ 。)

概率统计期末考试（2008 年 1 月 22 日）

（参考答案与评分标准）

一、（15 分）

(1) $p^* = p\pi + (1-p)(1-\pi)$, $p = (p^* - 1 + \pi)/(2\pi - 1)$, 当 $p^* = 0.55$, $\pi = 0.4$ 时,
 $p = 0.25$;

(2) 当 $\pi = 0.5$ 时, $p^* \equiv 0.5$, 由此无法解出 p 。

二、（15 分）

$$(1) F(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 1 \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 < x < 1 \\ \frac{1}{8}, & x = -1 \\ 0, & x < -1 \end{cases}; (2) = F(0) = \frac{7}{16}; (3) E(X) = \frac{1}{8}.$$

三、（20 分）

(1) $A = 12$; (2) 独立; (3) $f_Z(z) = 12(e^{-3z} - e^{-4z}), (z > 0)$;

(4) $f_{X|Z}(x|Z=1) = \frac{e^x}{e-1}$, $(0 < x < 1)$; $E(X|Z=1) = \frac{1}{e-1}$ 。

四、（20 分）

(1) $\theta^* = 1 - \Phi(2 - \bar{X})$; (2) $\mu \in \bar{X} \pm u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}$; $\theta \in \Phi(\bar{X} - 2 \pm u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}})$ 。

五、（15 分）

$$H_0: \mu_Z = 0 \leftrightarrow H_1: \mu_Z \neq 0$$

$$\frac{|\bar{Z}|}{S_Z/\sqrt{n}} = \frac{|-0.41|}{0.3872/\sqrt{10}} \approx 3.3485 > 2.2622 = t_{0.025}(9), \text{ 拒绝 } H_0, \text{ 有显著差异。}$$

六、（15 分）

$Z \approx 5.4437 < 5.9915 = \chi_{0.05}^2(2)$, 无法拒绝 H_0 , 未见有显著差异。

（完）

中国科学技术大学

2008—2009 学年第一学期考试试卷

考试科目： 概率论与数理统计 得 分： _____

学生所在系： _____ 姓 名 _____ 学 号： _____

(考期：2009 年 1 月 7 日，闭卷，可用计算器)

一、填空与单项选择

- (1) 连续掷一枚不均匀硬币（掷出正面的概率为 p ），直至正反面都掷出为止，设 X 为所掷的次数，则 X 的分布律为 ()
- (2) 设 X 与 Y 独立，都服从 $N(0,1)$ ，则 $(X+Y)^2/(X-Y)^2$ 的分布为 ()
- (3) 设样本 $X_1, \dots, X_n$ 抽自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 未知，则 μ 的 $(1-\alpha)$ 置信区间为 ()
- (4) 设 A 、 B 、 C 两两独立，则 A 、 B 、 C 相互独立的充要条件为：
(a) A 与 BC 独立 (b) AB 与 $(A+B)$ 独立 (c) AB 与 AC 独立 (d) $(A+B)$ 与 $(A+C)$ 独立
- (5) 若 $E(XY)=E(X)E(Y)$ ，则必有：
(a) $\text{Var}(XY)=\text{Var}(X)\text{Var}(Y)$ (b) $\text{Var}(X+Y)=\text{Var}(X)+\text{Var}(Y)$
(c) X 与 Y 独立 (d) X 与 Y 相关
- (6) 将一枚硬币连掷 n 次，以 X 与 Y 表示出现正面和反面的次数，则 $\rho_{X,Y}=(\quad)$ 。
- (7) $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的无偏估计，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}) = 0$ ，则 $\frac{n+1}{n} \hat{\theta}$ 为 θ 的：
(a) 无偏估计 (b) 最小方差无偏估计 (c) 相合估计 (d) 以上皆错

二、现有 4 白 6 黑共 10 个球，从中随机取 2 球，已知其中有一个白球，则另一个球也是白球的概率为多少？

三、设随机向量 (X,Y) 具有概率密度函数：
$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right), & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$
试分别求 X 、 Y 的期望、方差及 X 与 Y 的协方差和相关系数。

四、(利用中心极限定理求解) 某灯泡厂生产的灯泡的平均寿命原为 2000 小时，标准差为 250 小时，经过工艺改革，使平均寿命提高到 2250 小时，标准差不变。为了确认这一改革成果，主管部门派人来检查，办法是：任意挑选若干只灯泡来检测，若其平均寿命值超过 2200 小时，则认可这一成果。问：

- (1) 若挑选 160 只灯泡来检查，则其平均寿命值超过 2200 小时的概率约为多少？
- (2) 为了使检查通过的概率超过 0.997，问至少应检查多少只灯泡？

五、设样本 $X_1, \dots, X_n$ 抽自均匀分布 $R(\theta, 0)$, $(\theta < 0)$ ：

- (1) 试求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$ 和极大似然估计 θ^* ；
- (2) $\hat{\theta}$ 和 θ^* 是否为 θ 的无偏估计？若是请加以证明，若不是请加以修正。
- (3) 问(2)中所得的无偏估计，哪个更有效？

六、甲、乙、丙三个工厂生产同一种产品，产品质量分为 1、2、3 三个等级（分别代表高、中、低）。今从三个厂共抽得 300 件产品，逐一检测，的结果如下图所示：

- (1) 试问这三个厂产品质量是否一致？($\alpha = 0.01$)

(2) 若不一致, 试问哪个厂产品质量较优? 哪个厂产品质量较劣? 并请说明理由。

参考答案

一、(1) $P(X = k) = p^{k-1}q + q^{k-1}p, (q = 1 - p, k = 2, 3, 4 \dots)$ (2) $F_{1,1}$

(3) $\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}$ (4) — (7) abac

二、1/5

三、 $E(X)=5/7$ $E(Y)=8/7$ $Var(X)=23/490$ $Var(Y)=46/147$

$Cov(X,Y)=-1/147$ $\rho_{X,Y} = -\frac{\sqrt{15}}{69}$

四、 $P(\bar{X} > 2200) \approx \Phi(2.53) \approx 0.9943$ $n \geq 189$

五、(1) $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ $\theta^* = X_{(1)}$ (2) $\hat{\theta} = 2\bar{X} = \tilde{\theta}_1$ 无偏; $\theta^* =$ 有偏 $E\theta^* = \frac{n}{n+1}\theta$, 修正为

$\tilde{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}\theta^* = \frac{n+1}{n}X_{(1)}$ (3) $Var(\tilde{\theta}_1) = \frac{1}{n}\theta^2$ $Var(\tilde{\theta}_2) = \frac{1}{n(n+1)}\theta^2$

六、(1) 拒绝原假设, 认为三个厂产品质量不一致; (2) 甲厂最优, 丙厂最劣, 乙厂居间, 可分别计算三个厂产品质量的算术平均数, 愈小者愈优。

中国科学技术大学

2009—2010 学年第二学期考试试卷

考试科目： 概率论与数理统计 得 分： _____

学生所在系： _____ 姓 名 _____ 学 号： _____

(考期：2010 年 7 月 14 日，闭卷，可用计算器)

一、填空判断选择。

- (1) 掷 3 个骰子，已知三个点数各不相同，则其中至少有一个为 6 点的概率为 ()。
- (2) 设 $X_1, \dots, X_4$ 为相互独立的 $N(0,1)$ 变量， $T = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 + 4X_4)^2$ 服从卡方分布，则 $a=$ ____， $b=$ ____，此时 T 的自由度为____。
- (3) 设随机变量 X 与 Y 相互独立分别服从参数为 μ 和 λ 的 Poisson 分布，则 $P(X=k|X+Y=n)=$ ____，即在给定 $X+Y=n$ 的条件下， X 的条件分布为____。
- (4) 设 $\text{Var}(X)=\text{Var}(Z)$ ， $\text{Var}(Y)=4\text{Var}(X)$ ，相关系数 $\rho_{X,Y} = -1$ ， $\rho_{X,Z} = 1/2$ ，则 $\rho_{X,Y+Z} =$ ____。
- (5) 在假设检验中，第 I 类错误是指____；第 II 类错误是指____。
- (6) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取的样本， σ^2 未知，记样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S^2 ，则假设检验 $H_0: \mu \leq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$ (μ_0 为已知数) 的检验统计量为____。
- (7) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取的样本， μ, σ^2 为未知参数，则下面的量为 () 统计量。

$$(A) \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (B) \bar{X} - \mu \quad (C) S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (D) \sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/S$$

- (8) 若总体密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2}(x - \mu)^{-3/2}I(x > \mu + 1)$ ，则可以使用矩估计法估计参数 μ ，这种说法____。(A) 对 (B) 错
- (9) 设 $X \sim B(n, p)$ ，则当 n 趋于无穷时， $2\sqrt{n}(\arcsin\sqrt{X/n} - \arcsin\sqrt{p})$ 的分布函数收敛到标准正态分布，据此作出在 $X=90, n=150$ 情况下，参数 p 的置信系数为 0.95 的大样本区间估计_____。
- (10) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为从均匀总体 $U(0, \theta), \theta > 0$ 中抽取的样本，则 θ 的估计量 $X_{(n)}$ 为 θ 的：
(A) 无偏估计 (B) 相合估计 (C) 似然估计 (D) 矩估计

二、某工厂的第一、第二、第三号车间生产同一种产品，产量分别占总产量的 1/2，1/3 和 1/6，次品率分别为 1%、1%和 2%。现从该厂某批产品中随机抽取一件，则：

- (1) 求取的产品为次品的概率；
- (2) 若取出的产品为次品，求其是第二个车间生产的概率。

三、设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度可以表示成 $g(x^2 + y^2)$ ， g 为连续函数。令极坐标变换 $X=R\cos \theta$ ， $Y=R\sin \theta$ ，问 R 与 θ 是否相互独立，并求出各自的密度。

四、设 $X_1, \dots, X_n$ 为从均匀总体 $U(\theta, 2\theta)$ 中抽取的简单随机样本，试求：

- (1) 求 θ 的矩估计 $\tilde{\theta}$ 和极大似然估计 $\hat{\theta}$ ；
- (2) 矩估计 $\tilde{\theta}$ 和极大似然估计 $\hat{\theta}$ 是否为无偏估计？若不是，请加以修正，并说明修正

中国科学技术大学

2010—2011学年第一学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计 得分 _____

所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2010年12月26日下午2:30—4:30; 使用简单计算器

一. 填空判断选择题(每题3分,答题请写在试卷上):

- 1 掷3个骰子, 恰好有两枚点数相同的概率为_____.
- 2 设 $X_1, \dots, X_n$ 为相互独立的 $N(0, \sigma^2)$ 变量, 其中 σ^2 未知. 令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $\bar{X}$ 的分布为_____, nS^2/σ^2 的分布为_____.
- 3 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 同分布于期望为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布, 则 $\min\{X, Y\}$ 服从参数为_____的_____分布.
- 4 设 $Var(X) = 4Var(Y) = 1, Cov(X, Y) = 0.25$, 则 $X - Y$ 与 $X + Y$ 的相关系数 $\rho_{X-Y, X+Y} =$ _____.
- 5 设 A, B 为互斥事件, 则 A, B 相互独立的充分必要条件为_____.
- 6 参数估计量优良性的准则有_____(写出至少两个).
- 7 假设 X, Y 分别服从标准正态分布, 则 $X+Y$ 的分布仍为正态分布. 该说法_____.
(A) 正确 (B) 错误
- 8 总体参数的置信水平为95%的置信区间是指_____.
(A) 总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为95%
(B) 总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为5%
(C) 在用同样方法构造的总体参数的多个区间中, 包含总体参数的区间比例为95%
(D) 在用同样方法构造的总体参数的多个区间中, 包含总体参数的区间比例为5%
- 9 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自于正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 若要求参数 μ 的置信系数为0.95的置信区间长度不超过1, 则至少需要抽取的样本量 n 为_____.
(A) 14 (B) 16 (C) 18 (D) 20
- 10 进行1000次独立重复实验, 每次实验中事件 A 要么发生, 要么不发生, 且发生的概率为0.25, 则可以近似于95%的概率认为事件 A 发生的频率与概率相差不超过_____.
(A) 2.12% (B) 2.68% (C) 1.08% (D) 3.24%

二. (15分) 假定某种病菌在群体中的带菌率为1%. 在检测时, 带菌者和不带菌者被检测出阳性的概率分别为0.98和0.02.

- (1) 现有某人被测出呈阳性反应, 则他是带菌者的概率是多少?

(2) 为了进一步确认, 这个人决定再独立的做一次测试, 检测结果依然是阳性, 问在两次检测结果都呈阳性反应的情况下, 他确实为带菌者的概率是多少?

三. (15分) 设随机变量 (X, Y) 服从 $A = \{(x, y) : |x + y| \leq 1, |x - y| \leq 1\}$ 内的均匀分布, 则

- (1) 试求出 X 和 Y 的边际分布;
- (2) X 和 Y 是否相互独立? 不相关?
- (3) 求在 $X = x$ ($0 < x < 1$) 时 Y 的条件密度.

四. (15分) 设总体 X 的分布律为

X	1	2	3
P	p	$2p$	$1 - 3p$

现从此总体中抽出一样本量为 n 的样本, 发现其中 1 出现了 n_1 次, 2 出现了 n_2 次, 3 出现了 n_3 次. 试

- (1) 求 p 的极大似然估计量 $\hat{p}$ 和矩估计量 $\tilde{p}$.
- (2) 证明所得的估计量均为无偏估计, 并说明两个估计量何者最优.

五. (15分) 某针灸减肥机构宣称疗程结束后可以使参加者平均减少体重 5kg 以上, 为检验该广告是否可信, 调查人员随机调查跟踪了 10 名参加者, 测得他们参加前和参加后的体重(kg)为

参加前	65.39	62.89	63.50	60.83	63.07	62.88	57.80	63.07	66.05	70.78
参加后	61.72	59.43	59.64	57.30	58.50	60.84	51.89	60.02	63.67	65.67

假设参加前和参加后的体重服从正态分布, 试

- (1) 在显著性水平 0.05 下检验该机构的宣传是否可信.
- (2) 给出平均减少体重的 95% 置信区间.

六. (10分) 为研究女性和男性在美国选举中的偏好差异, 1991 年美国普通社会调查随机调查了 577 名女性和 403 名男性, 询问每人是倾向于 “支持民主党”, “支持共和党” 以及 “中立”, 得到的调查数据如下:

性别(Gender)	所支持政党(Party)			总计
	民主党(0)	中立(1)	共和党(2)	
女性(1)	279	73	225	577
男性(0)	165	47	191	403
总数	444	120	416	980

- (1) 为了检验选民政治倾向是否与性别有关, 试写出此问题的原假设.
- (2) 在显著性水平 0.05 下, 可否认为选民的政治倾向与性别无关?

附录 分位数: $u_{0.025} = 1.960$, $u_{0.05} = 1.645$, $t_{0.025}(10) = 2.228$, $t_{0.025}(9) = 2.262$, $t_{0.05}(10) = 1.812$, $t_{0.05}(9) = 1.833$, $\chi_{0.05}^2(1) = 3.841$, $\chi_{0.05}^2(2) = 5.991$.

2010-2011第一学期概率论与数理统计期末考试试卷答案

一. (30分, 每题3分) 1. $5/12$ 2. $N(0, \sigma^2/n)$, χ_n^2 3. $2\lambda e^{-2\lambda z} I(z > 0)$ 4. $3/\sqrt{21}$ 5. $P(A), P(B)$ 至少一个为0. 6. 无偏性, 相合性, 均方误差准则, 渐近正态性 7. B 8. C 9. B 10. B

二. (15分) (1) $\frac{0.98 \times 1\%}{0.98 \times 1\% + 0.02 \times 99\%} = \frac{49}{148} = 0.3311$
 (2) $\frac{0.98^2 \times 1\%}{0.98^2 \times 1\% + 0.02^2 \times 99\%} = 0.9604$

三. (15分) (1) 由对称性, X 和 Y 有相同的边际密度, $f(x) = \begin{cases} x+1, & -1 \leq x < 0 \\ 1-x, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$

(2) 显然 X 和 Y 不独立, 不相关.

(3) 易得 $f(y|x) = \frac{1}{2(1-x)} I(x-1 \leq Y \leq 1-x)$, 其中 $0 < x < 1$

四. (15分) (1) $\hat{p} = \frac{n_1+n_2}{3n}$; $\tilde{p} = \frac{3-\bar{X}}{4}$, 其中 $\bar{X} = \frac{n_1+2n_2+3n_3}{n}$;

(2) 由于 $En_1 = np, En_2 = 2np, En_3 = n(1-3p)$, 故知 $\hat{p}$ 和 $\tilde{p}$ 均为无偏估计, 容易得到 $var(\hat{p}) = \frac{p(1-3p)}{3n}$, 而 $var(\tilde{p}) = \frac{3p-8p^2}{8n}$, 于是由 $var(\hat{p}) < var(\tilde{p})$ 知似然估计 $\hat{p}$ 更有效.

五. (15分) 此为成对检验问题. 记 X 表示参加前后的体重差, 由题设知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 从而从保护消费者角度来看, 考虑假设 $H_0: \mu \leq 5 \leftrightarrow H_1: \mu > 5$, 易知此假设的水平 α 检验法则为

$$\text{当 } \sqrt{n} \frac{\bar{X} - 5}{S} > t_{\alpha}(n-1) \text{ 时拒绝原假设, 否则不足以拒绝原假设}$$

(1) 当 $\alpha = 0.05$ 时, 计算得 $\bar{X} = 3.758, S = 1.184575, n = 10$, 故

$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - 5}{S} = -3.315577 < t_{0.05}(9) = 1.833$, 从而在 0.05 水平下不足以拒绝原假设, 即该减肥机构的宣传不足以可信.

(2) 其95%置信区间为 $[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(9), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(9)]$, 带入数据得到 $[2.91, 4.61]$.

六. (10分) (1) 原假设可以表述为“ H_0 : 选民政治倾向与性别无关”.

(2) 在显著性水平 0.05 下, 对假设 H_0 , 根据拟合优度检验方法知

$$\begin{aligned} \chi^2 &= (279 - 444 * 577/980)^2 / (444 * 577/980) + (73 - 120 * 577/980)^2 / (120 * 577/980) \\ &\quad + (225 - 577 * 416/980)^2 / (577 * 416/980) + (165 - 403 * 444/980)^2 / (403 * 444/980) \\ &\quad + (47 - 120 * 403/980)^2 / (120 * 403/980) + (191 - 403 * 416/980)^2 / (403 * 416/980) \\ &= 7.009544 \end{aligned}$$

自由度为2, 从而有 $\chi^2 = 7.009544 > 5.99$, 因而拒绝原假设, 即拒绝“选民的政治倾向与性别无关”这一假设.

中国科学技术大学

2010—2011 学年第二学期考试试卷

考试科目： 概率论与数理统计 得 分： _____

学生所在系： _____ 姓 名 _____ 学 号： _____

(考期：2011 年 6 月 4 日，闭卷，可用计算器)

一、填空判断选择题。

- (1) 设 A, B, C 是三个相互独立的随机事件，且 $0 < P(C) < 1$ ，则在下列给定的四对事件中，不相互独立的是_____
(A) $\overline{A+B}$ 和 C (B) $\overline{AC}$ 和 C (C) $\overline{A-B}$ 和 $\overline{C}$ (D) $\overline{AB}$ 和 $\overline{C}$
- (2) 设 A, B, C 为三个事件，则下面的等式中正确的是_____
(A) $A \cup B - B = A - B$ (B) $(A - B) \cup B = A$
(C) $(A \cup B) - C = A \cup (B - C)$ (D) $A \cup B = (\overline{A}\overline{B}) \cup (\overline{A}B)$
- (3) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为两个概率密度函数，则 $af(x)+bg(x)$ 也是概率密度函数的充要条件为_____。
- (4) 随机变量 X 与 Y 不相关，则必有_____
(A) $\text{Var}(XY)=\text{Var}(X)\text{Var}(Y)$ (B) $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$
(C) X 与 Y 相互独立 (D) $EXY=EX*EY$
- (5) 设 $\hat{\theta}_n$ 为未知参数 θ 的一个估计量，如果设 $\lim_{n \rightarrow \infty} E|\hat{\theta}_n - \theta| = 0$ ，则 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的_____
(A) 无偏估计 (B) 有效估计 (C) 相合估计 (D) 渐进正态估计
- (6) 在实验次数无穷大时，某个事件发生的频率就等于其发生的概率，该说法_____
(A) 正确 (B) 错误
- (7) 连续型随机变量就是取值为连续区间的随机变量，该说法_____
(A) 正确 (B) 错误
- (8) 设 $X_1, \dots, X_n \text{ iid} \sim N(\mu, 1)$ ，考虑假设检验问题 $H_0: \mu = 0 \leftrightarrow H_1: \mu = 1$ ，由 μ 的极大似然估计可以得到一个水平 α 检验法则为_____；该检验法则犯第 II 类错误的概率为_____
- (9) 设基于某组样本得到的总体均值 μ 的 95% 置信区间为 $[0.234, 1.03]$ ，则我们可以在显著性水平_____下_____（接受或拒绝）零假设 $H_0: \mu = 0$ 。
- (10) 设某种产品的质量等级可以划分为“优”、“合格”和“不合格”，则使用拟合优度检验方法在检验生产此产品的三家工厂的产品没有差异这一假设时，检验统计量服从渐进卡方分布的自由度为_____

二、假设有 4 个罐子，其中第 k 个罐子里有 $k-1$ 个红球和 $4-k$ 个蓝球， $k=1,2,3,4$ 。现随机取出一个罐子，然后不放回地从中取两球，求：

- (1) 取出的两个球颜色不同的概率；
- (2) 若已知其中一个球为红球，则另外一个球也为红球的概率为多少？

三、设二维随机变量 X, Y 的联合概率密度函数为：

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

(1) 试求出 X, Y 的边际概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ；

(2) 试求出 $Z=2X-Y$ 的概率密度函数 $f_z(z)$;

(3) 试求 $P\left(Y \leq \frac{1}{2} | X = \frac{1}{2}\right)$ 。

四、某种疾病的发病率为 0.005，现随机调查 1000 人，考虑事件 A=“在调查的人中发病人数在 3 至 7 个人”，试：

(1) 使用 Poisson 逼近方法求 $P(A)$;

(2) 使用中心极限定理求 $P(A)$ 。

五、设样本 $Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立, $Y_i \sim N(a_i\mu, \sigma^2), i = 1, \dots, n$, 其中 $a_1, \dots, a_n$ 为已知不全为零的常数。

(1) 求 μ 和 σ^2 的极大似然估计 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\sigma}^2$;

(2) $\hat{\mu}$ 是否为 μ 的无偏估计?

(3) $\hat{\sigma}^2$ 是否为 σ^2 的无偏估计? 若是请加以证明, 若不是请加以修正。

六、为了了解甲乙两企业的职工工资水平, 分别从两个企业各随机抽取若干名职工调查, 的如下数据 (单位: 元):

甲企业	750	1060	750	1820	1140	1050	1000	
乙企业	1000	1900	900	1800	1200	1700	1950	1200

假设两个企业的工资分别服从正态分布, 且总体独立而均值方差未知。试根据以上数据判断:

(1) 两企业职工工资的方差是否相等 ($\alpha = 0.05$)

(2) 甲企业职工平均工资是否低于乙企业职工平均工资 ($\alpha = 0.05$)

2010-2011第二学期概率论与数理统计期末考试试卷答案

一. (30分, 每题3分)

1. B 2. A 3. $a + b = 1, af(x) + bg(x) \geq 0, \forall x$ 4. D 5. C 6. B 7. B

8. 当 $\bar{X} > u_\alpha/\sqrt{n}$ 时拒绝 H_0 , 否则不足以拒绝. $\Phi(u_\alpha - \sqrt{n})$

9. 0.05, 拒绝 10. 4

二. (15分) (1) $\frac{1}{4}[0 + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + 0] = \frac{1}{3}$

(2) $\frac{1}{2}$

三. (15分) (1) X 和 Y 的边际密度分别为, $f_X(x) = 2xI(0 < x < 1)$, $f_Y(y) = [1 - \frac{y}{2}]I(0 < y < 2)$.

(2) $f_Z(z) = [1 - \frac{z}{2}]I(0 < z < 2)$.

(3) $1/2$

四. (10分) (1) $\sum_{k=3}^7 \frac{5^k}{k!} e^{-5} = 0.742$

(2) $2\Phi(\frac{2}{\sqrt{5 \times 0.995}}) - 1 = 2\Phi(0.897) - 1 = 0.63$.

五. (15分) (1) $\hat{\mu} = \frac{\sum_i a_i y_i}{\sum_i a_i^2}$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_i (y_i - a_i \hat{\mu})^2$

(2) 是无偏估计.

(3) 不是无偏估计, 由于 $E\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_i E(y_i - a_i \hat{\mu})^2 = \frac{1}{n} \sum_i E(y_i - a_i \mu + a_i(\mu - \hat{\mu}))^2 = \frac{1}{n} [\sum_i E(y_i - a_i \mu)^2 - \sum_i a_i^2 E(\mu - \hat{\mu})^2] = \frac{1}{n} [\sum_i Var(y_i) - \sum_i a_i^2 Var(\hat{\mu})] = \frac{n-1}{n} \sigma^2$. 从而可以修正为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{n}{n-1} \hat{\sigma}^2$

六. (15分)

记 X_i, Y_j 分别为甲企业和乙企业的样本, 则由 $\bar{X} = 1081.429, S_X^2 = 129447.6, \bar{Y} = 1456.25, S_Y^2 = 181026.8$, 有

(1) 假设可以表述为 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

检验统计量 $0.175 = F_{0.975}(6, 7) < T = \frac{S_X^2}{S_Y^2} = 0.7151 < F_{0.025}(6, 7) = 5.119$, 故没有足够的理由认为两家企业工人工资方差不同.

(2) 由(1)的结果, 可以认为两组样本方差是相同的, 故对假设 $H_0: \mu_1 \geq \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 < \mu_2$

检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{15}{728}(6S_X^2 + 7S_Y^2)}} = -1.8265 < t_{0.05}(13) = 1.771$ 所以拒绝零假设, 故有充足的理由认为甲企业的平均工资低于乙企业的平均工资.

中国科学技术大学

2011—2012 学年第一学期考试试卷

考试科目： 概率论与数理统计 得 分： _____

学生所在系： _____ 姓 名 _____ 学 号： _____

(考期：2012 年 1 月 6 日，闭卷，可用计算器)

一、简单题 (写出简要步骤)。

- (1) 设一批电子元件由甲工厂和乙工厂共同生产，其中甲、乙两厂的生产份额分别为 60% 和 40%。根据经验可知甲、乙两工厂生产的电子元件的次品率分别为 1% 和 2%，现从这批产品中随机抽取一件，发现是次品，则该次品是甲厂生产的概率是多少？
- (2) 从 1, 2, 3, 4 四个数中任取一个数，记为 X ，再从 1 到 X 中任取一个数，记为 Y ，则 $\{Y=2\}$ 这个事件发生的概率是多少？
- (3) 设 X 的概率密度函数为 $f(x) = (1 + \theta)x^\theta, 0 < x < 1$ 。现考虑假设检验问题 $H_0: \theta = 5 \leftrightarrow H_1: \theta = 3$ 。该检验的否定域为 $X > 1/2$ ，则犯第一类错误和第二类错误的概率分别为多少？
- (4) 已知一批零件的长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$ ，从中随机抽取 16 个零件，得到长度的平均值为 40cm，试求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间？
- (5) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是一组独立同分布样本，且 $X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，试问 c 取多少才使得 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计？
- (6) 进行 1000 次独立重复试验，每次实验中事件 A 发生的概率为 0.25，试问能以 95% 的把握保证 1000 次实验中事件 A 发生的频率与概率相差不超过多少？

二、设随机向量 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布，其中 D 是由直线 $y=x, x=0, y=1$ 所围成的区域，试求：

- (1) (X, Y) 的联合密度 $f(x, y)$
- (2) (X, Y) 的边缘密度函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$
- (3) 条件密度 $f(x|Y=y)$
- (4) $E(X|Y=y)$

三、设总体 X 的概率分布如下表，其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数。现从此总体中随机抽取 100 个样本，发现有 17 个样本取值为 0，33 个样本取值为 1，50 个样本取值为 2。

X	0	1	2
P	$\theta/4$	$1-\theta$	$3\theta/4$

- (1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和极大似然估计 $\hat{\theta}_2$ ；并分别计算相应的计算值；
- (2) $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否是无偏的？若否，请加以修正；
- (3) 请问修正后的估计哪个更有效？

四、为了解男性和女性对三种类型的啤酒：淡啤酒、普通啤酒和黑啤酒的偏好有没有差异，分别调查了 180 位男士和 120 位女士，得如下数据：

	淡啤酒	普通啤酒	黑啤酒
男性	49	31	100
女性	51	20	49

请问男性和女性对这三种类型的啤酒的偏好有显著性差异吗？ ($\alpha = 0.05$)

五、为了比较新旧两种肥料对小麦产量的影响，研究者选择了面积相等、土壤等条件相同的 12 块土地，分别在 6 块地上施用新旧两种肥料。对于旧肥料，得到的产量数据是 17, 14, 18, 13, 19 和 15；而新肥料的产量数据为：16, 19, 20, 22, 18 和 19。假设两种肥料的产量分别服从正态分布，且总体独立，均值和方差未知。试根据以上数据判断：

- (1) 两种肥料产量的方差是否相等？（ $\alpha = 0.05$ ）
- (2) 新肥料获得的平均产量是否显著地高于旧肥料？（ $\alpha = 0.05$ ）

中国科学技术大学

2011—2012 学年第二学期考试试卷

考试科目：概率论与数理统计 得分：_____

学生所在系：_____姓 名_____学 号：_____

(考期：2012 年 6 月 9 日，闭卷，可用计算器)

一、判断题

(1) 若

二、(15 分) 设随机变量 X 满足： $|X| \leq 1$, $P(X = -1) = 1/8$, $P(X = 1) = 1/4$, 而且,

X 在 $(-1, 1)$ 内任一子区间上取值的概率与该子区间的长度成正比。试求：

(1) X 的概率分布函数 $F(x) = P(X \leq x)$;

(2) X 取负值的概率; (3) X 的数学期望 $E(X)$ 。

三、(20 分) 二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为：

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(3x+4y)}, & (x > 0, y > 0) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 试求系数 $A = ?$; (2) X 与 Y 是否独立?

(3) 试求 $Z = X + Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$;

(4) 试求 $Var(X | X + Y = 1)$ 。

2007—2008 学年，第一学期，第 1 页 (共 2 页)

四、(20 分) 设样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 抽自正态总体 $X \sim N(\mu, 1)$, μ 为未知参数

(1) 试求 $\theta = P(X \geq 2)$ 的极大似然估计 θ^* (结果可用 $\Phi(\cdot)$ 的形式表示);

(2) 写出 μ 的 $(1-\alpha)$ 置信区间, 并求 θ 的 $(1-\alpha)$ 置信区间。

五、(15 分) 为考查 A, B 两种制鞋材料的耐磨性, 用它们制作了 10 双鞋, 其中每双鞋的两只鞋分别用 A 和 B 两种材料制作(左、右脚两只鞋随机地采用 A 或 B)。10 个男孩试穿这 10 双鞋之后的磨损情况如下表所示 (数字代表磨损程度), 假定 A, B 两组数据的差服从正态

分布，问是否可以认为这两种材料的耐磨性无显著差异？（ $\alpha = 0.05$ ）

男孩	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>A</i>	13.2	8.2	10.9	14.3	10.7	6.6	9.5	10.8	8.8	13.3
<i>B</i>	14.0	8.8	11.2	14.2	11.8	6.4	9.8	11.3	9.3	13.6
差	-0.8	-0.6	-0.3	0.1	-1.1	0.2	-0.3	-0.5	-0.5	-0.3

六、（15 分）投资者感兴趣的一个问题，是上市公司股票价格的变化与其公司总部所在地是否有关。下表给出的是美国两个不同地区（公司总部所在地）的上市公司在 1998 年第三季度内股价变化情况。表格内的数字是相应的上市公司的个数。问股票价格的变化是否存在地区间的差异？（ $\alpha = 0.05$ ）

股价变化 总部所在地	上升	不变	下降
新英格兰地区	100	7	561
西北地区	88	10	370

（完）

（参考数值： $\chi^2_{0.025}(2) = 7.3778$ ； $\chi^2_{0.05}(2) = 5.9915$ ；
 $\chi^2_{0.025}(6) = 14.4494$ ； $\chi^2_{0.05}(6) = 12.5916$ ； $t_{0.025}(9) = 2.2622$ ；
 $t_{0.05}(9) = 1.8331$ ； $t_{0.025}(10) = 2.2281$ ； $t_{0.05}(10) = 1.8125$ 。）

2007—2008 学年，第一学期，第 2 页（共 2 页）

概率统计期末考试（2008 年 1 月 22 日） （参考答案与评分标准）

一、（15 分）

- $p^* = p\pi + (1 - p)(1 - \pi)$ ， $p = (p^* - 1 + \pi)/(2\pi - 1)$ ，当 $p^* = 0.55$ ， $\pi = 0.4$ 时，
 $p = 0.25$ ；
- 当 $\pi = 0.5$ 时， $p^* \equiv 0.5$ ，由此无法解出 p 。

二、(15 分)

$$(1) F(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 1 \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 < x < 1 \\ \frac{1}{8}, & x = -1 \\ 0, & x < -1 \end{cases}; (2) = F(0) = \frac{7}{16}; (3) E(X) = \frac{1}{8}.$$

三、(20 分)

$$(1) A = 12; (2) \text{独立}; (3) f_Z(z) = 12(e^{-3z} - e^{-4z}), (z > 0);$$

$$(4) f_{X|Z}(x|Z=1) = \frac{e^x}{e-1}, (0 < x < 1); E(X|Z=1) = \frac{1}{e-1}.$$

四、(20 分)

$$(1) \theta^* = 1 - \Phi(2 - \bar{X}); (2) \mu \in \bar{X} \pm u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}; \theta \in \Phi(\bar{X} - 2 \pm u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{1}{\sqrt{n}}).$$

五、(15 分)

$$H_0: \mu_Z = 0 \leftrightarrow H_1: \mu_Z \neq 0$$

$$\frac{|\bar{Z}|}{S_Z/\sqrt{n}} = \frac{|-0.41|}{0.3872/\sqrt{10}} \approx 3.3485 > 2.2622 = t_{0.025}(9), \text{拒绝 } H_0, \text{有显著差异}.$$

六、(15 分)

$$Z \approx 5.4437 < 5.9915 = \chi_{0.05}^2(2), \text{无法拒绝 } H_0, \text{未见有显著差异}.$$

(完)

中国科学技术大学

2011—2012学年第一学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计 得分 _____

所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2012年1月6日下午2:30—4:30; 使用简单计算器

一. 简答(写出简要步骤, 40分)

- (6分) 设工厂A和工厂B的产品的次品率分别为1%和2%, 现从由A厂和B厂的产品分别占60%和40%的一批产品中随机抽取一件, 发现是次品, 则该次品是A厂生产的概率是多少?
- (6分) 从数1, 2, 3, 4中任取一个数, 记为X, 再从1, $\dots$, X中任取一个数, 记为Y, 则请问 $Y = 2$ 这个事件发生的概率是多少?
- (8分) 设X的概率函数为 $f(x) = (1 + \theta)x^\theta$, $0 < x < 1$, 检验假设 $H_0: \theta = 5 \leftrightarrow H_1: \theta = 3$. 该检验的否定域为 $X > 1/2$, 则犯第一类错误概率和第二类错误的概率分别为多少?
- (6分) 已知一批零件的长度X(单位: cm)服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 从中随机抽取16个零件, 得到长度的平均值为40cm, 则 μ 的置信区间是多少?
- (6分) 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 样本 $X_1, \dots, X_n$ 来自总体X的一组样本, 请问c取多少事使得 $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计?
- (8分) 进行1000次独立重复试验, 每次试验中事件A发生的概率为0.25, 试问能以95%的把握保证1000次试验中事件A发生的频率与概率相差不超过多少?

二. (20分) 设随机向量 (ξ, η) 服从区域D上的均匀分布, 其中D是由直线 $y = x$, $x = 0$, $y = 1$ 所围成的区域. 试求:

- (1) (ξ, η) 的联合密度 $p(x, y)$;
- (2) (ξ, η) 的边缘密度 $p_1(x)$ 和 $p_2(y)$;
- (3) 条件密度 $p(x|\eta = y)$;
- (4) $E(\xi|\eta = y)$.

四. (15分) 人体中某个基因的形态有三种, 分别是AA, Aa, aa, 每个人的基因型只可能为这三种形态之一. 用 $X = 0, 1, 2$ 分别表示人的基因型为AA, Aa, aa. 设总体X中该基因的基因型概率分布如下表, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数. 现从此总体随机抽取了100人, 其中30个人具有基因型AA, 40人为Aa, 30人为aa.

X	0	1	2
P	θ^2	$2\theta(1 - \theta)$	$(1 - \theta)^2$

- (1) 求 θ 的矩估计 θ_1 和极大似然估计 θ_2 ; 并分别计算相应的估计值.
- (2) θ_1 和 θ_2 是否是无偏的? 若否, 请修正.
- (3) 请问修正后的估计那个更有效?

五. (10分)为了解男性和女性对三种类型的啤酒：淡啤酒、普通啤酒和黑啤酒的偏好有没有差异，分别调查了180位男士和120位女士的喜好，得如下数据

	淡啤酒	普通啤酒	黑啤酒
男性	49	31	100
女性	51	20	49

请问男性和女性对着三种类型的啤酒的偏好有显著差异吗？($\alpha = 0.05$)

六. (15分) 为比较新旧两种肥料对产量的影响，研究者选择了面积相等、土壤等条件的相同的20块地，分别施用新旧两种肥料，得到的产量数据如下：

旧肥料	17	15	18	17	13	15
新肥料	16	19	20	22	18	19

假设两种肥料的产量分别服从正态分布，且总体独立而均值方差均未知。试根据以上数据判断：

(1) 两种肥料产量的方差是否相等($\alpha = 0.05$)？

(2) 新肥料获得的平均产量是否显著地高于旧肥料($\alpha = 0.05$)。

附录 分布及分位数: $\Phi(0.897) = 0.815$, $u_{0.025} = 1.960$, $u_{0.05} = 1.645$, $t_{0.025}(13) = 2.16$, $t_{0.025}(14) = 2.145$, $t_{0.05}(13) = 1.771$, $t_{0.05}(14) = 1.761$, $\chi_{0.05}^2(1) = 3.841$, $\chi_{0.05}^2(2) = 5.991$, $F_{0.025}(6, 7) = 5.119$, $F_{0.025}(7, 6) = 5.695$.

2012-2013 第一学期概率论期末考试试卷

一. 判断选择题 (每题 3 分, 答题请写在试卷上):

1. 设 A, B, C 是三个随机事件, 则在下列不正确的是_____.

(A) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(B) $(A \cup B) \cap C = A \cup (B \cap C)$

(C) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

(D) $A \cap (\overline{B \cap C}) = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap \bar{C})$

2. 设事件 A 与自身独立, 则 A 的概率为_____.

(A) 0

(B) 1

(C) 0 或 1

(D) 1/2

3. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为两个概率密度函数, 则下述还是密度函数的是_____.

(A) $f(x)/g(x)$

(B) $f(x)-g(x)$

(C) $(f(x) + g(x))/2$

(D) $(1 + f(x))(1 - g(x))$

4. 随机变量 X 和 Y 独立, Y 和 Z 独立, 且都有期望方差, 则必有_____.

(A) X 和 Z 独立

(B) X 和 Z 不相关

(C) X 和 Z 相关

(D) $\text{Cov}(X, Y) = 0$

5. 设 $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) = P(A|\bar{B})$ 成立的充分必要条件是_____.

(A) $P(AB) = P(A)P(B)$

(B) $P(A + B) = P(A) + P(B)$

(C) $P(A) = P(B)$

(D) $P(A) = P(\bar{B})$

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自均匀分布 $U(-\theta, \theta)$ 的一组样本, θ 为未知参数, 则下述量为统计量的是_____.

(A) $\bar{X} - \theta$

(B) $\max_{1 \leq i \leq n} (X_i - \theta) - \min_{1 \leq i \leq n} (X_i - \theta)$

(C) $\max_{1 \leq i \leq n} (X_i - \theta)$

(D) $\min_{1 \leq i \leq n} (X_i - \theta)$

7. 假设从两个独立的正态总体中各得到样本量为 10 的两组样本, 若两个总体的方差相同, 则使用两样本 t 检验时 t 分布的自由度为_____.

- (A)9 (B)10 (C)18 (D)20

8. 当原假设 H_0 为真时, 检验 ϕ 有可能_____.

- (A) 犯一类错误 (B) 犯第二类错误
(C) 犯第一类或者第二类错误 (D) 同时犯第一类和第二类错误

9. 假设总体密度为 $f_\theta(x)$, 其中 θ 为参数. 若 X 为来自该总体的样本, 则下述不正确的是_____.

- (A) 固定 x 时 $f_\theta(x)$ 为似然函数 (B) 固定 θ 时 $f_\theta(x)$ 为似然函数
(C) 固定 θ 时 $f_\theta(x)$ 为密度函数 (D) $f_\theta(x)$ 衡量了不同 θ 下观测到 x 的可能性大小

10. 假设总体 X 为取值 $0, 1, 2$ 的离散型随机变量, 且取各值的概率分别为 $P(X=0)=0.5, P(X=1)=p, P(X=2)=0.5-p$, 其中 $0 < p < 0.5$ 为参数. 则当使用拟合优度检验时, 检验统计量的渐近卡方分布的自由度为_____.

- (A)3 (B)2 (C)1 (D)0

二.(15 分) 设昆虫产卵数目服从参数为 1 的 Poisson 分布, 而每个卵孵化为幼虫的概率为 p , 各卵是否孵化相互独立, 试求

- (1) 一个昆虫产生 m 个幼虫的概率.
(2) 若已知某个昆虫产生了 m 个幼虫, 求该昆虫产了 $n(n \geq m)$ 个卵的概率.

三.(15 分) 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 服从均匀分布 $U(-1, 1)$, Y 服从均值为 $1/2$ 的指数分布, 则

- (1) 求随机变量 $Z = (X+1)Y$ 和 X 的相关系数.
(2) 求条件概率 $P(Z > 1 | X = 0)$.

四.(15 分) 当 PM2.5 值全天监测平均在 35 微克/立方米以内时, 空气质量属于一级. 现观测到合肥市琥珀山庄过去 10 天的日平均 PM2.5 值分别为 28.24, 31.48, 33.85, 39.34, 37.78, 30.21, 29.92, 31.21, 30.17, 37.84. 若假设琥珀山庄区域日均 PM2.5 值 X 服从正态分布, 各天日均 PM2.5 值相互独立. 则

- (1) 试给出日均 PM2.5 值的 95% 置信上限.
(2) 若感兴趣空气质量为一级的概率 $p = P(X \leq 35)$, 试基于观测的日均数据给出 p 的极大似然估计.

五.(15 分) 设甲乙两家食用盐工厂生产的食盐每袋重量均服从正态分布 (忽略重量不可取负值). 现从这两家工厂产品中各随机抽出 10 件标称为 500 克的袋装食盐, 分别测得抽出各袋食盐的重量 (单位为克) 为

甲厂: 495, 494, 500, 502, 501, 492, 495, 495, 499, 503;

乙厂: 494, 506, 496, 505, 500, 508, 502, 504, 502, 499.

试问甲乙两家工厂生产这种标称为 500 克的袋装盐重量上有无差异 ($\alpha = 0.05$).

六.(10 分) 为研究人们每天阅读电子书的时间 (T) 长短与购买实体书 (Y) 两者之间的关系, 随机调查了 210 个人, 结果如下

	$t < 1$	$1 < t < 3$	$t > 3$
购买	12	70	20
不购买	40	28	40

试在水平 $\alpha = 0.05$ 下判断每天阅读电子书的时间长短和购买实体书两者之间是否有关? 阅读电子书的时间长短和购买实体书之间呈现何种特点?

一. 判断选择题 (每题 3 分):

1. B 2. C 3. C 4. D 5. A 6. B 7. C 8. A 9. B 10. C

二.(15 分) (1)

$$\begin{aligned} P(X=m) &= \sum_{n=m}^{\infty} P(X=m|Y=n)P(Y=n) = \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n}{m} p^m q^{n-m} \frac{1}{n!} e^{-1} \\ &= \frac{p^m}{m!} e^{-p}, \quad m=0,1,2,\dots \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} P(Y=n|X=m) &= \frac{P(X=m|Y=n)P(Y=n)}{P(X=m)} \\ &= \frac{q^{n-m}}{(n-m)!} e^{-q}, \quad n=m, m+1, \dots \end{aligned}$$

三.(15 分) (1) 由于 $EZX = E[X(X+1)]EY = 1/6, \text{Var}(Z) = 5/12$, 因此

$$\rho_{Z,X} = [EZ X - EZ \cdot EX] / \sqrt{\text{Var}(Z)\text{Var}(X)} = 1/\sqrt{5}$$

求随机变量 $Z = (X+1)Y$ 的期望和方差.

$$(2) P(Z > 1|X=0) = P(Y > 1) = e^{-2}.$$

四.(15 分)(1) 由于 $\bar{x} = 33.004, s = 3.95$, 在题设下易知日均 PM2.5 的 95% 置信上限为 $\bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0.05}(n-1)$, 带入样本值得到 35.5.

(2) $p = P(X \leq 35) = P(\frac{x-\mu}{\sigma} \leq \frac{35-\mu}{\sigma}) = \Phi(\frac{35-\mu}{\sigma})$, 而 $\bar{x}$ 和 $\sqrt{(n-1)/ns^2} = \sqrt{9/10}s = 3.75$ 为 μ 和 σ 的似然估计值, 因此 p 的极大似然估计值为 $\hat{p} = \Phi(\frac{\bar{x}-\hat{\mu}}{\hat{\sigma}}) = \Phi(0.53) = 0.70$.

五.(15 分) 记 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 分别表示两家工厂袋装盐的重量分布

(1) 考虑方差是否一致: 对假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 由检验统计量 $F = S_x^2/S_y^2 = 14.71/19.6 = 0.75 > F_{0.975}(9,9) = 1/F_{0.025}(9,9) = 1/4.03 = 0.25$, 因此在 0.05 水平下不能拒绝零假设。

(2) 考虑均值是否一致: 考虑假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, 由 (1) 结果知可以使用两样本 t 检验, 由检验统计量 $T = |\bar{x} - \bar{y}| / \sqrt{(s_x^2 + s_y^2)/10} = 2.16 > t_{0.025}(18) = 2.10$, 因此拒绝零假设。即在 0.05 水平下拒绝“两家工厂的袋装食盐平均重量一致”这一假设。

六.(10 分) 假设每天阅读电子书时间长短与购买实体书之间无关,则由 Pearson 卡方检验有 $T = \sum \frac{(O-E)^2}{E} = 39.60 > \chi_{0.05}(2) = 5.99$, 因此在 0.05 水平下拒绝“每天阅读电子书时间长短与购买实体书之间无关”这一假设。注意到在三类阅读时间下,购买实体书人的比例分别为 0.23, 0.71 和 0.33, 因此每天阅读电子书时间在 1 小时和 3 小时之间的人群购买实体书的比例最高,而当每天阅读电子书时间长于 3 小时后,购买实体书的人比例反而下降为 0.33.

2012-2013 第二学期概率论期末考试试卷

一. 判断选择题 (每题 3 分, 共 30 分, 答题请写在试卷上):

1. 设 A, B, C 为三个事件, 则事件 $\overline{ABC}$ 表示的是_____.

- (A) A, B, C 不同时发生 (B) A, B, C 中至少发生一个
(C) A, B, C 中至多发生一个 (D) A, B, C 至少发生两个

2. 随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且关于 y 的一元二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 0.5, 则 $\mu =$ _____.

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

3. 在数字 1, 2, 3, 4, 5 中不放回地随机连取两个数, 每次一个数. 则在第一次取出偶数的条件下, 第二次取出奇数的概率为_____.

- (A) $1/2$ (B) $3/4$ (C) $1/4$ (D) $1/3$

4. 设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 独立同分布于标准正态分布, 令 $T = a(2X_1 - X_2)^2 + b(X_3 + X_4)^2$. 则 $(a, b) =$ _____ 时候 T 服从自由度为 2 的卡方分布.

- (A) $(0, \frac{1}{2})$ (B) $(\frac{1}{5}, \frac{1}{2})$ (C) $(\frac{1}{5}, 0)$ (D) $(1, \frac{1}{2})$

5. 设随机变量 X, Y 的方差均为 σ^2 , 且两者的相关系数为 -0.5 , 则使得 $Z = \pi X + (1 - \pi)Y$ 的方差最小的 π 是_____.

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自某个存在期望 μ 和方差 σ^2 的总体的一组样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 分别为样本均值和样本方差, 则下述错误的是_____.

- (A) $\bar{X}$ 具有渐近正态性 (B) S_n^2 为 σ^2 的无偏估计
(C) $\bar{X}$ 为 μ 的无偏估计 (D) $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/S_n$ 服从 t_{n-1} 分布

7. 设参数 θ 的 95% 置信区间在某组样本值下为 $[1.2, 2.2]$, 则下述正确的是_____.

- (A) 区间 $[1.2, 2.2]$ 包含 θ 的概率为 95%
 (B) 区间 $[1.2, 2.2]$ 包含 θ 的概率为 5%
 (C) 区间 $[1.2, 2.2]$ 要么包含 θ 要么不包含 θ
 (D) 以上都不对

8. 关于假设检验中检验方法的一类和二类两种错误, 下述错误的是_____.

- (A) 两类错误不可避免
 (B) 固定样本量时两类错误不可能同时很小
 (C) 有可能同时犯一类和二类错误
 (D) 限制第一类错误概率的原则是假设检验理论中的通用做法

9. 假设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 其均值 μ 的 95% 置信区间为 $[0.22, 1.10]$, 则概率 $P(X \leq 0)$ 的 95% 置信区间为_____.

- (A) $[\Phi(0.22), \Phi(1.10)]$ (B) $[1 - \Phi(1.10), 1 - \Phi(0.22)]$
 (C) $[0.22, 1.10]$ (D) $[0, \Phi(1.10)]$

10. $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的样本, 假设检验问题 $H_0: \mu = 0 \leftrightarrow H_1: \mu = 1$ 的 0.05 水平检验为 $\sqrt{n}\bar{X} > 1.645$, 若要求该检验犯二型错误的概率也不超过 0.05, 则样本量 n 至少为_____.

- (A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

二.(15 分) 有甲乙两只口袋, 甲袋中有 5 只白球和 2 只黑球, 乙袋中有 4 只白球 5 只黑球. 先从甲袋中任取两球放入乙袋, 然后再从乙袋中任取一球. 试

(1) 求从乙袋中取出的球为白球的概率.

(2) 若已知从乙袋中取出的球为白球, 求从甲袋中取的两只球中有白色球的概率。

三.(15 分) 设随机变量 Y 的密度函数为 $f_Y(y) = 4y^3 I(0 < y < 1)$, 随机变量 X 在给定 $Y = y$ ($0 < y < 1$) 时服从均匀分布 $U(0, y)$. 试

(1) 求随机变量 X 的边际密度.

(2) 求 X 和 Y 的相关系数.

四.(20 分) 假设总体 X 的概率分布为 $X_1, \dots, X_n$ 为从该总体中抽取的一组简单样本, 则

X	0	1	2
P	p	$1 - 2p$	p

(1) 据此给出参数 p 的矩估计量 $\hat{p}_1$ 和极大似然估计量 $\hat{p}_2$.

(2) $\hat{p}_1$ 和 $\hat{p}_2$ 是否为无偏估计? 何者更有效?

(3) 若 $n = 100$, 且一组样本值中统计发现其中等于 0 的有 23 个, 等于 1 的有 53 个, 等于 2 的有 24 个. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 利用 $\hat{p}_2$ 和拟合优度检验方法, 我们能否认为“该组样本来自于总体 X ”?

五.(20 分) 假设某工厂产品的某个指标服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知. 现从该厂某批产品中随机抽取了 50 件产品测得该指标值的平均值为 89.70 和样本标准差为 1.09. 据此

(1) 能否认为该批产品该指标的平均值为 90($\alpha = 0.05$).

(2) 能否认为该批产品该指标的标准差不超过 1($\alpha = 0.05$).

(3) 给出该批产品此指标均值的 95% 置信区间, 并与 (1) 中假设检验结果比较, 能得出什么结论?

一.(30 分, 每题 3 分)

1. A 2. C 3. B 4. B 5. A 6. D 7. C 8. C 9. B 10. C

二.(15 分)(1) A = 从乙袋中取出白球, B_i 分别表示从甲袋中取出两只球中有 i 个白球 ($i = 0, 1, 2$), 则由全概率公式有

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_0)P(B_0) + P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) \\ &= \frac{4}{11} \cdot \frac{2}{42} + \frac{5}{11} \cdot \frac{20}{42} + \frac{6}{11} \cdot \frac{20}{42} \\ &= \frac{38}{77} \approx 0.494. \end{aligned}$$

(2) 由 Bayes 公式有

$$P(\bar{B}_0|A) = 1 - \frac{P(A|B_0)P(B_0)}{P(A)} = 1 - \frac{4/11 \cdot 2/42}{38/77} = 55/57 \approx 0.965.$$

三.(15 分) (1) 由联合概率密度函数 $f(x, y) = 4y^2 I(0 < x < y < 1)$ 易得

$$f_X(x) = \frac{4}{3}(1 - x^3)I(0 < x < 1)$$

(2) 易得 $EX = 2/5, Var(X) = 14/225$ 以及 $EY = 4/5, Var(Y) = 2/75$, $EXY = 1/3$. 从而 $\rho_{XY} = \frac{1/3 - 8/25}{\sqrt{14/225 \cdot 2/75}} = \sqrt{\frac{3}{28}} \approx 0.327$.

四.(20 分) (1) $\hat{p}_1 = \frac{a_2 - 1}{2}$ 和极大似然估计量 $\hat{p}_2 = \frac{n - n_1}{2n}$. 其中 $a_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, n_1 为样本中等于 1 的个数.

(2) $E\hat{p}_1 = p$ 和 $E\hat{p}_2 = p$ 均为无偏估计. $Var(\hat{p}_1) = \frac{5p - 2p^2}{2n} > Var(\hat{p}_2) = \frac{p(1-2p)}{2n}$, 故似然估计更有效.

(3) 卡方检验值为 $0.0213 < \chi_1^2(0.05) = 3.841$, 从而不能拒绝该组样本来自总体 X 的原假设.

五. (20 分) 该批产品该指标的平均值为 89.70 和样本标准差为 1.09. 据此

(1) 检验统计量 $|\sqrt{n}(\bar{X} - 90)/S| = 1.946 < t_{49}(0.025) = 2.010$, 因此在 0.05 水平下不能拒绝该批产品该指标的平均值为 90 的原假设.

(2) 检验统计量 $(n - 1)S^2 = 58.22 < \chi_{49}^2(0.05) = 66.339$, 因此在 0.05 水平下不能否认该批产品该指标的标准差不超过 1 的原假设.

(3) 置信区间为 $[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{n-1}(0.025), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{n-1}(0.025)] = [89.39, 90.01]$ 其包含了 90 这一点, 因此在 0.05 水平下不能拒绝该批产品该指标的平均值为 90 的原假设. 该置信区间为检验检验问题 (1) 的接受域.

2013-2014第一学期期末考试试卷及答案

一. 判断选择题 (每题3分,共30分,答题请写在试卷上):

1. 设事件 A, B 相互独立且 $P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(B - A) =$ _____.

- (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.3 (D) 0.4

2. 设 A, B, C 为三个事件,若 $P(A) = p, P(B) = 2p, P(C) = 3p$ 且 $P(AB) = P(BC)$, 则 p 的最大值为_____.

- (A) 1/3 (B) 1/4 (C) 1/5 (D) 1/6

3. 设 $X_n \sim B(n, p), 0 < p < 1$, 则当 n 很大时, 下列叙述不正确的是_____.

(A) $\frac{X_n}{n}$ 依概率收敛到 p (B) 若 $np \approx 5$, 则 X_n 近似服从参数为5的泊松分布

(C) $\frac{X_n}{n}$ 近似服从 $N(p, \frac{p(1-p)}{n})$ (D) $\frac{X_n - np}{\sqrt{p(1-p)}}$ 近似服从 $N(0, 1)$

4. 袋中有10个球, 里面有0个, 1个, 2个, ..., 10个白球是等可能的. 今向袋中放入一个白球, 然后随机从袋中取出一个球, 则这个球为白球的概率是_____.

- (A) 5/10 (B) 6/11 (C) 5/11 (D) 4/11

5. 设随机变量 (X, Y) 服从二元正态分布, 且有 $Var(X) = 1, Var(Y) = 4$. 令 $W = X - aY, V = X + aY$, 则当 $a =$ _____时 W 和 V 相互独立.

- (A) 1 (B) $1/\sqrt{2}$ (C) 1/2 (D) 1/4

6. 假设 θ 的一个无偏估计量为 $\hat{\theta}$, 其在一组样本下的值为1.2, 则下述描述正确的是_____.

(A) $E\hat{\theta} = 1.2$ (B) $\theta = 1.2$ (C) 估计量 $\hat{\theta}$ 不存在系统性误差 (D) $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计

7. 考虑假设检验问题 $H_0: \theta = 0 \leftrightarrow H_1: \theta = -1$, 若 $T = T(X)$ 为 θ 的估计量, 则该假设的拒绝域有形式_____(其中 c 为合适的常数).

- (A) $T > c$ (B) $T < c$ (C) $|T| > c$ (D) $|T| < c$

8. 某电子计算机有100个终端, 每个终端有15%的可能处于闲置状态, 若各终端被使用与否是相互独立的, 则至少有15个终端空闲的概率约为_____.

- (A) 0.3 (B) 0.4 (C) 0.5 (D) 0.6

9. 设 X_1, X_2, X_3 为来自正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 则 $S = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从分布_____.

(A) $F(1, 1)$ (B) $F(2, 1)$ (C) $t(1)$ (D) $t(2)$

10. $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的样本, 若要求 μ 的 95% 置信区间长度不超过 0.2, 则样本量 n 至少为_____.

(A) 382 (B) 383 (C) 384 (D) 385

二.(10分) 假设某种品牌的饮料做促销活动, 消费者每买一瓶该饮料可获得奖品A和B之一, 且获得奖品A和B的概率分别为0.2和0.8. 若某人既想获得A又想获得B, 问他平均要买几瓶该品牌的饮料?

三.(15分) 设随机变量 X 的概率分布为 $P(X = 1) = P(X = 2) = 0.5$, 随机变量 Y 在给定 $X = k$ 时服从均匀分布 $U(0, k)$, ($k = 1, 2$). 试

(1) 求随机变量 Y 的分布函数 $F_Y(y)$.

(2) 求 X 和 Y 的相关系数.

四.(20分)

$X_1, \dots, X_n$ 和 $Y_1, \dots, Y_m$ 为分别来自正态总体 $N(\theta, 1)$ 和 $N(\theta, 4)$ 中抽取的独立样本, 记 $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$, $\bar{Y} = \sum_{j=1}^m Y_j/m$.

试

(1) 证明 θ 的最大似然估计为 $\hat{\theta} = \frac{4n}{4n+m} \bar{X} + \frac{m}{4n+m} \bar{Y}$.

(2) 证明 $\hat{\theta}$ 在一切形如 $c\bar{X} + d\bar{Y}$ 的无偏估计里方差最小.

(3) 基于 $\hat{\theta}$, 作出 θ 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

五. (15分) 装配一个部件可以采用不同的方法. 现在关心的是哪一种方法的效率更高. 从使用两种装配方法装配的部件中各独立随机的抽取 12 件, 记录它们的装配时间(单位:分钟), 得到

甲方法: 30 34 34 35 34 28 34 26 31 31 38 26

乙方法: 26 32 22 26 31 28 30 22 31 26 32 29

若假设两种装配方法的装配时间均服从正态分布, 则

(1) 两种装配方法装配时间的方差有无显著差异? ($\alpha = 0.05$).

(2) 两种装配方法的平均装配时间有无显著差异? ($\alpha = 0.05$).

六. (10分) 袋中有 8 个球, 其中红球数未知. 在其中任取 3 个, 记录红球的个数 X , 然后放回再任取 3 个, 记录红球个数, 然后放回. 如此反复进行了 112 次, 得到结果如下:

X	0	1	2	3
次数	1	31	55	25

试在 $\alpha = 0.05$ 水平下检验假设 H_0 : 红球的个数为 5.

一. 1. (B) 2. (B) 3. (D) 4. (B) 5. (C) 6. (C) 7. (B) 8. (C) 9. (C) 10. (D)

二. 设需要买 X 瓶才能即得到 A 又得到 B , 则对 $n \geq 2$ 有

$$P(X = n) = 0.2^{n-1} \times 0.8 + 0.8^{n-1} \times 0.2.$$

于是

$$EX = \sum_{n=2}^{\infty} n \times 0.2^{n-1} \times 0.8 + n \times 0.8^{n-1} \times 0.2 = 5.25.$$

或者

$$EX = 0.2E(X|A) + 0.8E(X|B) = 0.2(1 + 1/0.8) + 0.8(1 + 1/0.2) = 5.25.$$

三. (1). 当 $y \geq 0$ 时有

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ 0.75y, & 0 \leq y \leq 1; \\ 0.5 + 0.25y, & 1 < y < 2; \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$$

(2). 容易得出

$$EX = 1.5, EX^2 = 0.5(1 + 4) = 2.5, EY = E(Y|X = 1)P(X = 1) + E(Y|X = 2)P(X = 2) = 0.5(0.5 + 1) = 0.75, EY^2 = \frac{5}{6}, E(XY) = 1.25.$$

进而

$$\text{Var}(X) = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{4}, \text{Var}(Y) = \frac{13}{48}, \text{Cov}(X, Y) = EXY - EXEY = \frac{1}{8}.$$

最后

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \sqrt{\frac{3}{13}}.$$

四. (1) 由对数似然函数

$$l(\theta) \propto -\frac{1}{2} \sum (X_i - \theta)^2 - \frac{1}{8} \sum (Y_j - \theta)^2$$

$$\text{看见其最大值为 } \hat{\theta} = \frac{4n}{4n+m} \bar{X} + \frac{m}{4n+m} \bar{Y}.$$

(2) 由无偏性知 $c + d = 1$, 再由方差

$$\text{Var}(c\bar{X} + (1-c)\bar{Y}) = c^2 \frac{1}{n} + (1-c)^2 \frac{4}{m}$$

最小化该方差得到 $c = \frac{4n}{4n+m}$, 对比 $\hat{\theta}$ 从而得证.

(3) 由于 $\hat{\theta} \sim N(\theta, \frac{4}{4n+m})$, 从而 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\hat{\theta} \pm u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{4}{4n+m}}$$

五.(1) 考虑假设: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 则使用 F 检验, 易知

$$F_{0.975}(11, 11) = \frac{1}{F_{0.025}(11, 11)} < F = S_1^2/S_2^2 = 14.02/12.63 = 1.11 < F_{0.025}(11, 11)$$

因此不能拒绝 H_0 , 可以认为两种方法装配时间的方差没有差异.

(2) 考虑假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, 由题设和(1)中的结论知应使用两样本 t 检验. 易知检验统计量值为 $2.5722 > t_{0.025}(22)$, 因此拒绝零假设, 认为两种方法的平均装配时间有差异.

六. 在假设 H_0 下, 理论分布为

$$P(X=i) = \frac{C_5^i C_3^{3-i}}{C_8^3}, i=0, 1, 2, 3$$

即 $P(X=0) = 1/56, P(X=1) = 15/56, P(X=2) = 30/56, P(X=3) = 10/56$. 从而由拟合优度检验方法

$$T = \sum \frac{(O-E)^2}{E} = 2.2 < \chi_{0.05}^2(3)$$

因此不能拒绝零假设.

一、单项选择填空题 (每题 3 分, 共 30 分, 答题请写在试卷上):

- 考虑 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 的一个随机排列, 与原来位置序号相同的数字个数记为 N (比如排列 513246 与原来位置序号只有数字 3 和 6 是相同的, 所以 $N = 2$), 则 $EN =$ _____
- 设 $X \sim N(1, 9), Y \sim N(1, 16)$, 且 X 与 Y 的相关系数为 $\rho_{XY} = -1/2$, 设 $Z = \frac{X}{2} + \frac{Y}{3}$, 则 X 和 Z 的相关系数 $\rho_{XZ} =$ _____
- 下列哪些函数不是概率密度或者分布律? _____
(A) $f(x) = \frac{1}{2}I\{a - 3/2 \leq x \leq a\} + \frac{1}{4}I\{a - 1 \leq x \leq a\}, a \in \mathbb{R}$
(B) $f(x) = \frac{5}{6}I\{a - 3/2 \leq x \leq a\} - \frac{1}{4}I\{a - 1 \leq x \leq a\}, a \in \mathbb{R}$
(C) $P(X = k) = \frac{1}{2^k}, k = 0, 1, 2, \dots$
(D) $f(x) = \lambda \alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x^\alpha} I\{x > 0\}, \lambda > 0, \alpha > 0$
- 若两随机事件 A, B 相互独立, 下列哪些说法不正确? _____
(A) $P(A|B) = P(A|B^c)$ (B) $P(A|B) = P(A^c|B)$
(C) $P(B|A) = P(B|A^c)$ (D) $P(B^c|A) = P(B^c|A^c)$
- 假设盒子中有一个不知颜色是黑色还是白色的球, 现在给盒子里再放一个白球, 然后从中随机拿出一个球, 发现是白色的。则此时盒中剩余的球是白色的概率为 _____
(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$
- 下述对正态总体均值的置信区间的表述错误的是 _____
(A) 置信度愈高, 则可靠性愈高
(B) 置信度愈高, 则置信区间愈宽
(C) 置信区间的大小与测量次数的平方根成正比
(D) 置信区间的位置取决于测量的平均值
- 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则下述正确的是 _____
(A) $X + Y$ 服从正态分布 (B) $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布
(C) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布 (D) $\frac{X^2}{Y^2}$ 服从 F 分布
- 下述对一个检验方法的第二类错误描述错误的是 _____
(A) 在给定样本量下, 第二类错误的概率不可能任意小
(B) 在对立假设空间的子集下控制第二类错误的概率, 可以用来确定样本量大小
(C) 在有限样本量下, 第二类错误是不可避免的
(D) 在一个检验结果是拒绝零假设时候, 我们会有很大的风险犯第二类错误
- 下述检验正态性假设的方法中错误的是 _____
(A) 直方图方法 (B) 拟合优度检验方法
(C) 使用偏度系数和峰度系数 (D) t 检验
- 若一个总体的期望和方差分别为 μ 和 σ^2 , 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的一组简单样本, 则总体变异系数 $\frac{\sigma}{\mu}$ 的相合估计为 _____

二、(15 分) 假设 $Y \sim U(0, \theta), \theta > 1$, 若随机变量 $X = \begin{cases} Y, & Y \geq 1 \\ 0, & Y < 1 \end{cases}$ 。试求

(1) X 的分布函数。(2) 期望 EX 。

三、(15 分) 设某生产线上组装每件产品的时间服从指数分布, 平均需要 10 分钟, 且各产品的组装时间是相互独立的。

(1) 试求组装 100 件产品需要 15 小时至 20 小时的概率。

(2) 保证有 95% 的可能性, 问 16 小时内最多可以组装多少件产品。

四、(15 分) 称随机变量 $X \sim \text{Exp}(a, b)$, 如果 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{b} e^{-(x-a)/b} I(x > a)$, 其中 $a \in \mathbb{R}, b > 0$ 为参数。现从总体 $\text{Exp}(a, 1)$ 中抽取简单样本 $X_1, \dots, X_n$, 从总体 $\text{Exp}(a, 2)$ 中抽取简单样本 $Y_1, \dots, Y_m$, 且两组样本相互独立。试

(1) 求 a 的矩估计和最大似然估计。

(2) 是否都为无偏估计? 若不是, 请修正为无偏估计, 并比较修正后的估计何者最优。

五、(15 分) StreetInsider.com 报道了 2002 年一些著名公司的每股收益的数据. 在 2002 年之前, 财务分析家就预测了这些公司 2002 年的每股收益. 利用下面数据评论实际的和预测的每股收益的差异.

公司	实际每股收益	预测每股收益	公司	实际每股收益	预测每股收益
AT&T	1.29	0.38	埃克森 - 美孚	2.72	2.19
美国运通	2.01	2.31	通用电气	1.51	1.71
花旗银行	2.59	3.43	强生	2.28	2.18
可口可乐	1.60	1.78	麦当劳	0.77	1.55
杜邦	1.84	2.18	沃尔玛	1.81	1.74

试

(1) 在显著性水平 0.05 下, 检验实际的和预测的每股平均收益之间是否存在差异, 你的结论是什么?

(2) 两均值之差的点估计是多少? 分析家是低估还是高估了每股的收益?

(3) 给出两均值之差的 95% 置信区间, 并据此对 (1) 的检验问题作出结论并解释。

六、(10 分) 用甲、乙、丙、丁四种棉纱织成坯布, 其中用甲纱织成的 18 匹坯布中 17 匹为上等品, 乙纱织成的 15 匹坯布中 11 匹为上等品, 丙纱织成的 15 匹坯布中 8 匹为上等品, 丁纱织成的 13 匹坯布中 11 匹为上等品, 问这四种棉纱的质量有无显著差异? (显著性水平为 0.05)

一、1. 1; 2. $\frac{5}{\sqrt{73}}$; 3. C; 4. B; 5. C; 6. C; 7. C; 8. D; 9. D; 10. $\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}{\sqrt{n}\bar{X}}$ (答案不唯一).

二、1.

$$F_X(x) = P(Y \leq x|Y \geq 1)P(Y \geq 1) + P(0 \leq x|Y < 1)P(Y < 1)$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{x}{\theta}, & x > 1. \end{cases}$$

2.

$$E[X] = E[X|Y \geq 1]P(Y \geq 1) + E[X|Y < 1]P(Y < 1) = E[Y|Y \geq 1]P(Y \geq 1) + E[0|Y < 1]P(Y < 1)$$

$$= \frac{\theta - 1}{\theta} \frac{1 + \theta}{2} = \frac{\theta^2 - 1}{2\theta}.$$

三、

1. $X_1, \dots, X_{100}$ i.i.d $\sim \text{Exp}(6)$.

$$P(15 \leq \sum_{i=1}^{100} X_i \leq 20) = P\left(\frac{15 - 50/3}{10/6} \leq \frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 100/6}{\sqrt{100} * 1/6} \leq \frac{20 - 50/3}{10/6}\right)$$

$$\approx \Phi(2) - \Phi(-1) = \Phi(2) - 1 + \Phi(1).$$

2.

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq 16\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n/6}{\sqrt{n}/6} \leq \frac{16 - n/6}{\sqrt{n}/6}\right) \approx \Phi\left(\frac{96 - n}{\sqrt{n}}\right) = 0.95.$$

$$\frac{96 - n}{\sqrt{n}} = 1.645$$

$$n = 81.19.$$

最多可以组装 81 个。

四、1.

$$E[X] = a + 1, E[Y] = a + 2.$$

所以 a 的矩估计为

$$\hat{a}_1 = 2\bar{X} - \bar{Y}$$

其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m Y_i$. (a 的矩估计不唯一, 比如另一估计为 $\hat{a}_1 = (\bar{X} + \bar{Y} - 3)/2$)

由于似然函数为

$$L = \exp\left\{-\sum_{i=1}^n (X_i - a) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (Y_i - a)\right\} 1_{\{X_{(1)} > a, Y_{(1)} > a\}}.$$

易见似然函数在 $a < \min\{X_{(1)}, Y_{(1)}\}$ 时是关于 a 单调递增的。从而得到 a 的极大似然估计为

$$\hat{a}_2 = \min\{X_{(1)}, Y_{(1)}\}.$$

2.

$$E[\hat{a}_1] = E[\bar{X} - \bar{Y}] = a.$$

对 $x > a$,

$$P(\min\{X_{(1)}, Y_{(1)}\} \leq x) = 1 - P(\min\{X_{(1)}, Y_{(1)}\} > x) = 1 - \prod_{i=1}^n e^{-(x-a)} \prod_{i=1}^m e^{-\frac{x-a}{2}} = 1 - e^{-\frac{(2n+m)(x-a)}{2}}.$$

则 $\min\{X_{(1)}, Y_{(1)}\}$ 的密度函数为

$$f(x) = \frac{2n+m}{2} e^{-\frac{(2n+m)(x-a)}{2}} 1_{\{x>a\}}.$$

即 $\hat{a}_2 \sim \text{Exp}(a, \frac{2}{2n+m})$ 。从而

$$E[X] = \int_a^\infty x \frac{2n+m}{2} e^{-\frac{(2n+m)(x-a)}{2}} dx = a + \frac{2}{2n+m}$$

所以基于最大似然估计 $\hat{a}_2$ 的修正后的无偏估计为

$$\hat{a}_2^* = \hat{a}_2 - \frac{2}{2n+m}$$

容易得到

$$\text{Var}(\hat{a}_1) = 4 \frac{n+m}{nm}$$

以及

$$\text{Var}(\hat{a}_2^*) = \text{Var}(\hat{a}_2) = \frac{4}{(2n+m)^2}$$

因此, 显然 $\hat{a}_2^*$ 更有效。

五、1. 此数据为成对数据, 利用一样本 t 检验: $Z_i = X_i - Y_i, i = 1, \dots, 10, \text{ iid } \sim N(\mu, \sigma^2)$.

$$H_0: \mu = 0 \longleftrightarrow H_1: \mu \neq 0.$$

$$T = \frac{\sqrt{10} \sum_{i=1}^{10} (X_i - Y_i)}{S_{X-Y}}|_{H_0} \sim t_9.$$

代入样本数据有

$$t = -0.6048 > -t_9(0.025) = -2.262.$$

因此, 我们不拒绝原假设, 即在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 实际与预测的平均收益不存在差异。

2. 实际的每股平均收益 - 预测的每股平均收益

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^{10} (X_i - Y_i)}{10} = -0.103 < 0$$

, 说明从点估计角度来说, 分析家是高估了每股的收益。

3. 两个均值之差的 95% 的置信区间为

$$\left[-0.103 - \frac{S}{\sqrt{n}} t_9(0.025), -0.103 + \frac{S}{\sqrt{n}} t_9(0.025) \right] = [-0.488, 0.282]$$

此置信区间为检验问题 (1) 的接受域。包含了 0 点, 因此检验问题的结论是接受原假设, 即可以认为实际的和预测的每股平均收益没有差异。

六、这是齐一性检验, 计算

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(17 - 18 * 47/61)^2}{18 * 47/61} + \frac{(11 - 15 * 47/61)^2}{15 * 47/61} + \frac{(8 - 15 * 47/61)^2}{15 * 47/61} \\ &+ \frac{(11 - 13 * 47/61)^2}{13 * 47/61} + \frac{(1 - 18 * 14/61)^2}{18 * 14/61} + \frac{(4 - 15 * 14/61)^2}{15 * 14/61} + \frac{(7 - 15 * 14/61)^2}{15 * 14/61} \\ &+ \frac{(2 - 13 * 14/61)^2}{13 * 14/61} = 8.389 > 7.815 = \chi_3(0.05). \end{aligned}$$

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 四种棉纱的质量有显著性差异。

中国科学技术大学

2015—2016学年第二学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计 得分 _____

所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2016年6月24日上午8:30-10:30; 使用简单计算器

一. (10分) 判断题, 答案可以直接写在试卷上.

1. 若事件 A 和 B 满足 $P(A|\bar{B}) = P(A)$, 则 A 和 B 相互独立. ()
2. 一维连续型随机变量的分布函数是 $(-\infty, \infty)$ 上的连续函数. ()
3. 若一个参数 θ 的某个估计量 $\hat{\theta}$ 的值刚好等于 θ , 则 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一个无偏估计. ()
4. 在假设检验中所遵循的原则是哪个假设成立的概率大就接受哪个假设. ()
5. 在假设检验中接受原假设则一定不会犯第一类错误. ()

二. (20分) 填空题或单选题, 答案可以直接写在试卷上.

1. (4分) 主人要外出, 委托邻居给花园的花浇水. 若不浇水, 则花死去的概率为0.8; 若浇水, 则花死去的概率为0.2. 假设有0.9的把握确定邻居会记得浇水. 那么, 主人回来时花还活着的概率为_____; 若主人回来花已死, 则邻居忘记浇水的概率为_____.
2. (3分) 设 X 服从参数为 λ 的Poisson分布. 若已知 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda =$ _____.
3. (3分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{2}} - e^{-\frac{y}{2}} + e^{-\frac{x+y}{2}}, & x, y > 0; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

那么 X 与 Y 是否相互独立? _____(填“是”或“否”).

4. (3分) 设随机变量 X 和 Y 的方差分别是4和9, 且它们的相关系数为-0.5, 则 $X - Y$ 的方差为_____.
5. (3分) 设随机变量 X 和 Y 均服从标准正态分布, 则().
(A) $X + Y$ 服从正态分布 (B) $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布
(C) X^2/Y^2 服从 F 分布 (D) X^2 和 Y^2 服从 χ^2 分布
6. (4分) 设总体 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - x^{-\beta}, & x > 1; \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$$

其中 $\beta > 1$ 为未知参数, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一组简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$. 那么, 参数 β 的矩估计量和极大似然估计量分别是_____和_____.

三. (18分) 设 X 和 Y 分别表示两只不同型号的灯泡的寿命, X 服从参数为 λ 的指数分布, Y 服从参数为 μ 的指数分布, 且它们相互独立.

1. 求先失效的那只灯泡的寿命(即 $Z = \min\{X, Y\}$)的分布.
2. 求 $U = X/Y$ 的概率密度函数.

四. (16分) 某人寿保险公司推出一项团购活动, 每个参保人在年初付150元保险费, 而在该年死亡时家属可从公司获得5万元赔偿金. 假设有1万名几乎同龄和同阶层的人参加该保险, 且已知该类人群在一年内死亡的概率是0.002. 利用中心极限定理求在此项业务中,

1. 保险公司亏本的概率是多少?
2. 保险公司获得的毛利润不少于50万的概率是多少?

五. (16分) 设总体 X 的期望为 μ , 方差为 σ^2 . 分别抽取容量为 n_1 和 n_2 的两个独立样本, 样本均值依次为 $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$.

1. 证明: 对满足 $a + b = 1$ 的任意常数 a 和 b , 统计量 $Y = a\bar{X}_1 + b\bar{X}_2$ 均为 μ 的无偏估计.
2. 试确定 a 和 b 的值使得上述估计量 Y 最有效.

六. (20分) 热处理车间工人为了提高振动板的硬度, 对淬火温度进行试验, 在两种淬火温度A与B中分别测得硬度如下:

温度A	85.6	85.9	85.9	85.7	85.8	85.7	86.0	85.5	85.4	85.5
温度B	86.2	85.7	86.5	86.0	85.7	85.8	86.3	86.0	86.0	85.8

设振动板的硬度服从正态分布, 利用假设检验的知识判断淬火温度的改变是否对振动板的硬度具有显著性影响(显著性水平取 $\alpha = 0.05$).

附录

$$u_{0.025} = 1.960, u_{0.05} = 1.645, \Phi(2.24) = 0.9874$$

$$F_{10,10}(0.025) = 3.72, F_{9,9}(0.025) = 4.03, F_{10,10}(0.05) = 2.98, F_{9,9}(0.05) = 3.18,$$

$$t_{20}(0.025) = 2.086, t_{19}(0.025) = 2.093, t_{18}(0.025) = 2.101,$$

中国科学技术大学

2016—2017学年第一学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计(B) 得分 _____

所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2017年1月3日上午8:30–10:30; 使用简单计算器

一. (30分, 每小题均3分) 填空题或单选题, 答案可以直接写在试卷上.

1. 设 A 和 B 为随机事件, $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, P(A|B) = 0.4$, 则().
(A) A 与 B 相互独立 (B) A 与 B 互斥
(C) $A \supset B$ (D) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
2. 甲乙二人进行网球比赛, 每回合胜者得 1 分, 且每回合甲胜的概率为 $p(0 < p < 1)$, 乙胜的概率为 $1 - p$, 比赛进行到有一人比另外一个人多 2 分就终止, 多 2 分者最终获胜, 则甲最终获胜的概率为_____.
3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的Poisson分布, 且已知 $P(X = 1) = P(X = 2)$, 则 X 取值为 3 的概率为_____.
4. 设随机变量 X 和 Y 均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 且已知 $P(X \leq 2, Y \leq -2) = 0.25$, 则 $P(X > 2, Y > -2) =$ _____.
5. 设 X 和 Y 相互独立且分别服从均值为 1 和 $1/4$ 的指数分布, 则 $P(X < Y) =$ _____.
6. 设随机变量 X_1 和 X_2 相互独立, 方差均存在, 且概率密度函数分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$. 若 Y_1 的概率密度函数为 $[f_1(y) + f_2(y)]/2$, 而 $Y_2 = (X_1 + X_2)/2$, 则().
(A) $E[Y_1] > E[Y_2], \text{Var}[Y_1] > \text{Var}[Y_2]$ (B) $E[Y_1] = E[Y_2], \text{Var}[Y_1] = \text{Var}[Y_2]$
(C) $E[Y_1] = E[Y_2], \text{Var}[Y_1] < \text{Var}[Y_2]$ (D) $E[Y_1] = E[Y_2], \text{Var}[Y_1] > \text{Var}[Y_2]$
7. 在假设检验中, 下列关于拒绝域和接受域说法错误的是().
(A) 与显著性水平 α 有关 (B) 与所构造的统计量的分布有关
(C) 随样本观测值的不同而改变 (D) 互不相交
8. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $N(1, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 则 $T = \frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_3 + X_4 - 2)^2}$ 的分布为().
(A) t_1 (B) $F_{1,1}$ (C) $F_{2,2}$ (D) 以上皆不正确.
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自二项总体 $B(n, p)$ 的一组简单随机样本, 且记 $\bar{X}$ 和 S^2 为样本均值和样本方差. 若 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的一个无偏估计, 则常数 $k =$ _____.
10. 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中参数 μ 和 σ^2 均未知. 若样本容量 n 和置信系数 $1 - \alpha$ 均保持不变, 对于不同的样本观测值, 则总体均值 μ 的置信区间长度().
(A) 始终保持不变 (B) 与 μ 的真值有关
(C) 与样本均值有关 (D) 不固定.

二. (11分) 设二维随机向量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Ax^2, & 0 < |x| < y < 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

试求常数 A 的值及条件概率 $P(X \leq 0.25 | Y = 0.5)$.

三. (16分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P(X = 0) = P(X = 2) = 0.5$, Y 的概率密度函数为 $f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

1. 求 $P(Y \leq EY)$;

2. 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数.

四. (15分) 某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体进行 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的. 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|$, $i = 1, 2, \dots, n$. 现利用这些绝对误差来估计标准差 σ .

1. 求 Z_i 的概率密度函数;

2. 利用一阶矩求 σ 的矩估计量;

3. 求 σ 的极大似然估计量.

五. (18分) 在质量管理中, 产品的优良性和稳定性可以分别用均值和方差来体现. 要比较甲乙两厂所生产的电视机的质量是否有差异, 对两厂所生产的各 10 台产品的使用情况进行追踪调查, 得到这 20 台电视机的寿命(单位: 年)数据如下:

甲	8	7	9	5	12	10	9	10	8	7
乙	10	8	5	7	8	7	11	4	5	6

设电视机的寿命服从正态分布, 利用假设检验的知识判断两厂所生产电视机的寿命是否有显著差异(显著性水平取 $\alpha = 0.05$).

六. (10分) 对截止目前为止一共 44 位美国总统(含候任总统 Trump)的星座进行分析, 发现十二星座中天蝎座和水瓶座各有 5 人, 双子座和射手座各有 3 人, 处女座和白羊座各有两人, 而其余星座均有 4 人. 于是有人宣称有些星座擅长当美国总统, 而有些星座则不擅长. 结合你所学的知识, 说明该说法是否有统计学上的依据?(显著性水平取 $\alpha = 0.05$)

附录: 上分位数表

$F_{10,10}(0.025) = 3.72$, $F_{9,9}(0.025) = 4.03$, $F_{10,10}(0.05) = 2.98$, $F_{9,9}(0.05) = 3.18$,

$t_{20}(0.025) = 2.086$, $t_{19}(0.025) = 2.093$, $t_{18}(0.025) = 2.101$, $\chi_{11}^2(0.05) = 24.725$.

参考答案

一. 每小题3分

1. A 2. $p^2/[p^2 + (1-p)^2]$ 或 $p^2/(1-2p+2p^2)$ 3. $\frac{4}{3}e^{-2}$ 或 0.18 4. 0.25 或 $1/4$
 5. 0.2 或 $1/5$ 6. D 7. C 8. B 9. -1 10. D

二. 常数 $A = 6$. (5分)

由 $f_Y(y) = 4y^3, 0 < y < 1$ 及 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{3x^2}{2y^3}, -y < x < y$, 可知 $f_{X|Y}(x|\frac{1}{2}) = 12x^2, -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$. 故

$$P(X \leq 1/4 | Y = 1/2) = \int_{-1/2}^{1/4} 12x^2 dx = \frac{9}{16}. \quad (6分)$$

三. 1. 由 $EY = \frac{2}{3}$, 知 $P(Y \leq EY) = \int_0^{2/3} 2y dy = 4/9$. (6分)

2. 对任意 $0 < z < 3$, 由全概率公式可知

$$\begin{aligned} P(Z \leq z) &= \frac{1}{2}P(Y \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z-2) \\ &= \begin{cases} z^2/2, & 0 \leq z < 1; \\ 1/2, & 1 \leq z < 2; \\ ((z-2)^2 + 1)/2, & 2 \leq z < 3. \end{cases} \quad (5分) \end{aligned}$$

从而 Z 的概率密度函数为

$$l(z) = \begin{cases} z, & 0 \leq z < 1; \\ z-2, & 2 \leq z < 3; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad (5分)$$

四. 1. 概率密度函数为 $f(z) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\{-\frac{z^2}{2\sigma^2}\}$, $z > 0$. (5分)

2. 由于 $E[Z_i] = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}$, 故 σ 的矩估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \bar{Z}$, 其中 $\bar{Z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i$. (5分)

3. 由对数似然函数为 $l(\sigma) = c - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2$, 其中 c 为一与 σ 无关的常数, 令 $\frac{dl(\sigma)}{d\sigma} = 0$, 可知 σ 的极大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i^2}$.

五. 由样本观测值得 $\bar{x} = 8.5, s_1^2 = 3.83, n_1 = 10; \bar{y} = 7.1, s_2^2 = 4.99, n_2 = 10$. (4分)

先检验两总体的方差是否相等. 此时 $F = \frac{3.83}{4.99} = 0.768$, 而由附表可得 $F_{9,9}(0.025) = 4.03, F_{9,9}(0.975) = 1/4.03 = 0.248$. 因为 $0.248 < F < 4.03$, 我们可以认为两总体方差相等. (7分)

再检验两总体均值是否相等. 此时 $s_w^2 = 4.411$, 而统计量 $t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} = -1.235$. 故由 $|t| < t_{18}(0.025) = 2.101$, 我们也可认为两总体均值相等. 综上可知, 我们可以认为两厂所生产电视机的寿命没有显著性差异. (7分)

六. 首先建立假设 H_0 : 每个星座当上美国总统的可能性是一样的. 计算 χ^2 统计量的值为 $2.91 < \chi_{11}^2(0.05) = 24.725$. 接受 H_0 , 故我们可以认为该说法没有统计学上的依据.

中国科学技术大学

2017—2018学年第一学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计(B) 得分 _____

所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2018年1月10日上午8:30-10:30; 使用简单计算器

一. (30分, 每小题3分) 填空题或单选题, 答案可以直接写在试卷上.

- (1) 设随机事件 A 和 B 相互独立, A 和 C 相互独立, 且 B 和 C 互斥. 若 $P(A) = P(B) = 1/2$, $P(AC|AB \cup C) = 1/4$, 则 $P(C) =$ _____.
- (2) 一只蚂蚁从等边三角形 $\triangle ABC$ 的顶点 A 出发开始沿着边爬行, 设它每次爬行到一个顶点后, 会休憩片刻再随机选择一条边继续爬行, 则第 n 次爬行是往 A 爬的概率为 _____.
- (3) 设连续型随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x)dx = 0.4$, 则 $P(X < 0) = ()$
(A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.4 (D) 0.5
- (4) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi(\frac{x-4}{2})$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 X 的数学期望 $EX =$ _____.
- (5) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率分布为 $P(X=1) = P(X=-1) = 1/2$, Y 服从参数为 $\lambda > 0$ 的Poisson分布. 若记 $Z = XY$, 则 $\text{Cov}(X, Z) =$ _____.
- (6) 设将1米长的木棒随机截成两段, 其中一段的长度记为 X , 另一段长度的 $1/3$ 记为 Y , 则 X 与 Y 的相关系数为()
(A) 1 (B) -1 (C) -1/3 (D) 1/3
- (7) 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的一组简单随机样本, 则下列统计量中服从 F 分布的是()
(A) $\frac{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}{X_4^2 + X_5^2 + \dots + X_9^2}$ (B) $\frac{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}{X_5^2 + X_6^2 + X_7^2 + X_8^2 + X_9^2}$ (C) $\frac{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}{2(X_4^2 + X_5^2 + \dots + X_9^2)}$ (D) $\frac{2(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2)}{X_4^2 + X_5^2 + \dots + X_9^2}$
- (8) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一组简单随机样本, 以 $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差. 若记 $\text{Var}(X) = \sigma^2$, 则()
(A) S 是 σ 的无偏估计量 (B) S 是 σ 的极大似然估计量
(C) S 与 $\bar{X}$ 相互独立 (D) 以上均不对
- (9) 设来自总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 一组容量为9的简单随机样本, 其样本均值 $\bar{X} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为0.95的置信区间为 _____ (保留到小数点后三位).
- (10) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 据此样本做假设检验 $H_0: \mu = \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$, 其中 μ_0 是给定的已知常数, 则()
(A) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0
(B) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必接受 H_0
(C) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0
(D) 如果在检验水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 那么在检验水平 $\alpha = 0.01$ 下必拒绝 H_0

二. (16分) 设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = Ce^{-2x^2+2xy-y^2}, \quad -\infty < x, y < \infty.$$

(1) 求常数 C 的值;

(2) 在 $X = x$ 的条件下, 求 Y 的条件密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

三. (16分) 设二维随机向量 (X, Y) 服从二元正态分布 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 其中 $\mu_1 = \mu_2 = 1$, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 0.5$, $\rho = 0.5$. 记

$$Z = |X - Y|, \quad U = \max(X, Y), \quad V = \min(X, Y).$$

(1) 求 Z 的密度函数 $f_Z(z)$;

(2) 求数学期望 $E(U + V)$;

(3) 分别求数学期望 EU 和 EV .

四. (18分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{2x}{a^2}, \quad 0 \leq x \leq a,$$

其中 $a > 0$ 为未知参数, 而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一组简单随机样本.

(1) 求 a 的矩估计量 $\hat{a}_1$ 和极大似然估计量 $\hat{a}_2$;

(2) 求 $p = P(0 < X < \sqrt{a})$ 的极大似然估计量 $\hat{p}$;

(3) 问 $\hat{a}_1$ 和 $\hat{a}_2$ 是否为无偏估计? 若是, 请证明你的结论; 若不是, 请修正之.

五. (10分) 为了检验某种体育锻炼对减肥的效果, 随机抽取了10名减肥者进行测试. 在进行体育锻炼前后这些减肥者的体重(单位: 千克)数据列表如下, 问该体育锻炼方法对降低体重是否具有显著性(设人的体重服从正态分布, 取显著性水平 $\alpha=0.05$)?

锻炼前体重	70	65	67	58	69	72	74	61	63	67
锻炼后体重	68	60	68	58	67	70	70	60	60	65

六. (10分) 上海证券综合指数简称“上证指数”, 反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况. 自上证指数诞生的二十七年(1991年1月至2017年12月)以来, 所有月份上涨或下跌的情况如下:

月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
上涨月数	14	21	16	15	14	14	13	15	11	13	18	13
下跌月数	13	6	11	12	13	13	14	12	16	14	9	14

结合你所学的知识, 我们能否认为上证指数的涨跌与月份有关?

附录: 上分位数表

$$u_{0.025} = 1.96, \quad u_{0.05} = 1.645;$$

$$t_8(0.025) = 2.306, \quad t_8(0.05) = 1.86, \quad t_9(0.025) = 2.262, \quad t_9(0.05) = 1.833;$$

$$\chi_{11}^2(0.05) = 19.675.$$

参考答案

一. (每小题3分)

$\frac{1}{4}$; $\frac{1}{3}[1 - (-\frac{1}{2})^{n-1}]$; B; 2; λ ; B; D; C; [4.412, 5.588]; A.

二. (1) (8分) 由

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2x^2+2xy-y^2} dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2} dy = \pi$$

可知 $C = \frac{1}{\pi}$;

(2) (8分) 由于 X 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2},$$

从而,

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-y)^2}, \quad -\infty < y < \infty.$$

三. (1) (6分) 由 $E(X - Y) = 0$,

$$\begin{aligned} \text{Var}(X - Y) &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= 0.5 + 0.5 - 2 \times 0.25 = 0.5, \end{aligned}$$

及二元正态分布的性质可知 $X - Y \sim N(0, 0.5)$, 从而 $Z = |X - Y|$ 的密度函数为

$$f_Z(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2}, \quad z > 0.$$

(2) (4分) 易知, $E(U + V) = E(X + Y) = 2$.

(3) (6分) 由 $EU - EV = EZ = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$, 可知 $EU = 1 + \frac{1}{2\sqrt{\pi}}$, $EV = 1 - \frac{1}{2\sqrt{\pi}}$.

四. (1) (6分) 矩估计量 $\hat{a}_1 = \frac{3}{2}\bar{X}$, 极大似然估计量 $\hat{a}_2 = X_{(n)}$;

(2) (4分) 由 $p = \frac{1}{a}$ 知其极大似然估计量为 $\hat{p} = 1/X_{(n)}$;

(3) (8分) 矩估计 $\hat{a}_1$ 是无偏的, 因 $E(\hat{a}_1) = \frac{3}{2}E(\bar{X}) = \frac{3}{2}E(X) = a$; 而由 $X_{(n)}$ 的密度函数为

$$h(x) = n[F(x)]^{n-1}f(x) = \frac{2n}{a^{2n}}x^{2n-1}, \quad 0 < x < a,$$

知 $E(\hat{a}_2) = \frac{2n}{2n+1}a$. 故 $\hat{a}_2$ 不是无偏估计, 可修正为 $\hat{a}_2^* = \frac{2n+1}{2n}X_{(n)}$.

五. (10分) 成对数据. 首先可算得相减之后, 有 $\bar{X} = 2$, $S^2 = 28/9$. 故由

$$t = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} = 3.59 > t_9(0.05) = 1.833,$$

可拒绝原假设 (H_0 : 锻炼前后体重无显著变化), 即认为该体育锻炼方法对降低体重具有显著性.

六. (10分) 列联表齐一性检验. 两行的和分别为177和147, 每列之和均为27. 由此可算得 χ^2 统计量的值为 $11.394 < \chi_{11}^2(0.05) = 19.675$, 故可认为“无充分证据表明上证指数的涨跌与月份有关”或“上证指数的涨跌与月份无关”.

中国科学技术大学

2018—2019学年第一学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计(B) 得分 _____

所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2019 年1月9日上午8:30-10:30; 使用简单计算器

一、(30分, 每小题3分) 填空题或单选题, 答案可以直接写在试卷上.

(1) 已知 10 台洗衣机中有 7 台一等品和 3 台二等品, 现已售出一台, 在余下的 9 台中随机抽取 2 台后发现均为一等品, 则原先售出的一台为二等品的概率为_____.

(2) 设随机变量 X 的概率密度 $f(x) = Ae^{-x^2+x}$, $-\infty < x < \infty$, 则常数 $A =$ _____.

(3) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且它们的取值范围分别是 $\{1, 2\}$ 和 $\{1, 2, 3\}$. 已知

$$P(Y = 1) = \frac{1}{6}, \quad P(X = 1, Y = 2) = P(Y = 1, X = 2) = \frac{1}{8},$$

则 $P(Y = 3) =$ _____.

(4) 设随机变向量 (X, Y) 的分布函数为 $\Phi(2x)\Phi(y-1)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则 (X, Y) 服从二元正态分布()

(A) $N(0, 1; \frac{1}{4}, 1; 0)$ (B) $N(0, -1; \frac{1}{4}, 1; 0)$ (C) $N(0, 1; 4, 1; 0)$ (D) $N(0, -1; 4, 1; 0)$

(5) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 服从参数为 2 的泊松分布, Y 服从区间 $[-3, 3]$ 上的均匀分布, 则它们的乘积的方差 $\text{Var}(XY) =$ _____.

(6) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自标准正态总体的简单随机样本, $a > 0$ 为某个常数. 若已知

$$Y = a\left(\frac{1}{2}X_1^2 + \frac{1}{2}X_2^2 + \frac{1}{2}X_3^2 + \frac{1}{2}X_4^2 + X_1X_2 + X_3X_4\right)$$

服从 χ_n^2 分布, 则 $n + a =$ _____.

(7) 已知随机变量 X 服从 $F_{3,4}$ 分布. 设对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 实数 $F_{3,4}(\alpha)$ 满足 $P(X > F_{3,4}(\alpha)) = \alpha$. 若有 $P(X \leq x) = 1 - \alpha$, 则 x 等于()

(A) $\frac{1}{F_{4,3}(1-\alpha)}$ (B) $\frac{1}{F_{3,4}(1-\alpha)}$ (C) $F_{4,3}(\alpha)$ (D) $F_{4,3}(1-\alpha)$

(8) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀总体 $U[-\theta, \theta]$ 的简单随机样本, 则参数 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$ 为()

(A) $\max_{1 \leq i \leq n} X_i$ (B) $\max_{1 \leq i \leq n} |X_i|$ (C) $-\min_{1 \leq i \leq n} X_i$ (D) $-\min_{1 \leq i \leq n} |X_i|$

(9) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 且 $\bar{X}$ 为样本均值. 若统计量 $T = c(X_1 + X_n - 2\bar{X})^2$ 为 σ^2 的无偏估计, 则常数 $c =$ _____.

(10) 已知两个正态总体 X_1 和 X_2 分别为 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 为了检验总体 X_1 的均值大于 X_2 的均值, 则应作检验的假设为()

(A) $H_0: \mu_1 > \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \leq \mu_2$ (B) $H_0: \mu_1 \geq \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 < \mu_2$
(C) $H_0: \mu_1 < \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \geq \mu_2$ (D) $H_0: \mu_1 \leq \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 > \mu_2$

二、(24分) 设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{5}(2x + y), \quad 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1.$$

- (1) 分别求 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;
- (2) 在给定 $X = 1$ 的条件下, 求 Y 在点 $y = 0.5$ 处的概率密度 $f_{Y|X}(0.5|1)$;
- (3) 求 X 和 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$;
- (4) 求随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

三、(12分) 某药厂试制了一种新药, 声称对贫血患者的治疗有效率达到 80%. 医药监管部门随机抽取 200 个贫血患者进行此药的临床试验, 若至少有 152 人用药有效, 就批准此药的生产. 试利用中心极限定理, 求解如下问题:

- (1) 若该药的有效率确实达到 80%, 此药被批准生产的概率大约是多少?
- (2) 若监管部门的方案是 200 个人中要有 160 人用药有效才批准, 这对药厂是否公平? 需说明理由.

四、(18分) 已知总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} -\theta^x \ln \theta, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的一组简单随机样本.

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;
- (2) 求 $h(\theta) = (\ln \theta)^{-1}$ 的极大似然估计量 $\hat{h}_\theta$;
- (3) 试求实数 a , 使得 $\hat{h}_\theta$ 依概率收敛到 a , 即对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{h}_\theta - a| \geq \varepsilon) = 0$.

五、(8分) 为比较A和B两种型号步枪子弹的枪口速度, 随机地抽取A型子弹 10 发, 得到枪口速度的平均值为 $\bar{x} = 500(\text{m/s})$, 样本标准差 $s_1 = 1.10(\text{m/s})$; 随机地抽取B型子弹 20 发, 得到枪口速度的平均值为 $\bar{y} = 496(\text{m/s})$, 样本标准差 $s_2 = 1.20(\text{m/s})$. 假设A和B型号子弹的枪口速度分别近似服从方差相等的正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$. 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 5 \leftrightarrow H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 5$.

六、(8分) 某机构为了研究鼻咽癌是否与血型有关, 随机调查了一些患者和健康人, 得到的数据如下:

	A	B	O	AB
患者	64	86	130	20
健康人	125	138	210	26

请你根据所学的统计知识给出适当的结论(显著性水平设为 $\alpha = 0.05$).

附录: 上分位数表

$$u_{0.025} = 1.96, u_{0.05} = 1.645, \Phi(1.414) = 0.9214;$$

$$t_{28}(0.025) = 2.0484, t_{28}(0.05) = 1.7011, t_{29}(0.025) = 2.0452, t_{29}(0.05) = 1.6991;$$

$$\chi_3^2(0.95) = 0.3518, \chi_3^2(0.05) = 7.8147.$$

参考答案

一. (每小题3分)

$3/8$; $\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{1}{4}}$; $1/3$; A; 18; 3; A; B; $\frac{n}{2(n-2)}$; D.

二. (1) (6分) 由边缘密度和联合密度的关系可知,

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_0^1 f(x, y) dy = \frac{2}{5}x + \frac{1}{10}, \quad 0 \leq x \leq 2; \\ f_Y(y) &= \int_0^2 f(x, y) dx = \frac{2}{5}y + \frac{4}{5}, \quad 0 \leq y \leq 1. \end{aligned}$$

(2) (6分) 由边缘密度、条件密度和联合密度的关系可知,

$$f_{Y|X}(0.5|1) = \frac{f(1, 0.5)}{f_X(1)} = 1.$$

(3) (6分) 由

$$E[XY] = \int_0^1 \int_0^2 xyf(x, y) dx dy = \frac{2}{3},$$

及 $EX = \frac{19}{15}$ 和 $EY = \frac{8}{15}$, 可知 $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - EXEY = -\frac{2}{225}$.

(4) (6分) 由

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = \iint_{x, y \leq z} f(x, y) dx dy$$

可知,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0; \\ \frac{3}{10}z^3, & 0 \leq z < 1; \\ \frac{1}{5}z^2 + \frac{1}{10}z, & 1 \leq z < 2; \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

从而, 所求密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{9}{10}z^2, & 0 \leq z < 1; \\ \frac{2}{5}z + \frac{1}{10}, & 1 \leq z < 2. \end{cases}$$

三. (1) (6分) 所求概率为 $\Phi(\sqrt{2}) = 0.9214$.

(2) (6分) 不公平. 对药厂而言, 在治疗有效率达到80%的情况下被批准的概率大约为 $\Phi(0) = 0.5$, 这相当于用掷硬币的方式来决定是否得到批准.

四. (1) (6分) 矩估计量 $\hat{\theta} = \exp\{-\frac{1}{\bar{X}}\}$, 其中 $\bar{X}$ 为样本均值;

(2) (6分) 参数 θ 的极大似然估计量同样为 $\exp\{-\frac{1}{\bar{X}}\}$, 从而 $h(\theta)$ 的极大似然估计量为 $\hat{h}_\theta = -\bar{X}$;

(3) (6分) 由弱大数律可知, 所求的实数 $a = -EX = \frac{1}{\ln \theta}$.

五. (8分) 两样本 t 检验, 其检验统计量为

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \mu_0}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}.$$

代入数据计算可知, $s_w = 1.169, t = -2.209$. 由于 $|t| > t_{28}(0.025) = 2.0484$, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下我们应该拒绝原假设 H_0 .

六. (8分) 拟合优度联列表检验. 原假设为鼻咽癌与血型无关, 而其检验统计量为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^4 \frac{(nn_{ij} - n_{i.}n_{.j})^2}{nn_{i.}n_{.j}}.$$

代入数据计算可知, $\chi^2 = 1.921 < \chi_3^2(0.05) = 7.8147$. 故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下我们不能拒绝原假设, 即可以认为鼻咽癌与血型无关.

中国科学技术大学

2018—2019学年第二学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计 得分 _____

所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2019年6月19日下午14:30—16:30; 使用简单计算器

一. 简答(写出简要步骤, 40分)

1. (6分) 设一批电子产品由甲和乙两工厂共同生产, 其中甲, 乙两工厂生产的份额分别为60%和40%。根据经验可知甲, 乙两工厂生产该产品的次品率分别为1%和2%, 现从这批产品中随机抽取一件, 发现是次品, 则该次品是甲厂生产的概率是多少?
2. (6分) 设某保险公司每个月受理的索赔事件个数服从参数为 λ 的Poisson分布, 而每个索赔成功的概率为 p , 且各个索赔彼此之间没有关系。二月份该公司有 k 个索赔成功的概率是多少? 若该月份有 k 个索赔成功, 则它受理了 m ($m \geq k$)个索赔事件的概率是多少?
3. (6分) 设 X 的概率密度函数为 $f(x) = (1 + \theta)x^\theta$, $0 < x < 1$. 现考虑假设检验问题 $H_0: \theta = 5 \leftrightarrow H_1: \theta = 3$. 该检验的否定域为 $X > 1/2$, 则犯第一类错误的概率和第二类错误的概率分别为多少?
4. (6分) 已知一批零件的长度 X (单位: cm)服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 从中随机抽取16个零件, 得到长度的平均值为40cm, 试求 μ 的置信水平为0.95的置信区间?
5. (8分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的独立同分布样本, 且都只取正值, 试求数学期望:

$$E\left(\frac{X_1}{\sum_{i=1}^n X_i}\right).$$

6. (8分) 某工厂为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人(工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备300台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是0.01. 在通常情况下一台设备的故障可由一个人来处理(我们也只考虑这种情况), 问至少需配备多少工人, 才能保证设备发生故障但不能及时维修的概率小于0.01?

二. (20分) 设随机向量 (ξ, η) 服从区域 D 上的均匀分布, 其中 D 是由直线 $y = x$, $x = 0$, $y = 1$ 所围成的区域. 试求:

- (1) (ξ, η) 的联合密度 $p(x, y)$;
- (2) (ξ, η) 的边缘密度 $p_1(x)$ 和 $p_2(y)$;
- (3) 条件密度 $p(x|\eta = y)$;
- (4) $E(\xi|\eta = y)$.

三. (15分) 设总体 X 的概率分布如下表, 其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数. 现从此总体中随机抽取100个样本, 发现有17个样本取值为0, 33个样本取值为1, 50个样本取值为2.

X	0	1	2
P	$\frac{\theta}{4}$	$1 - \theta$	$\frac{3\theta}{4}$

- (1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和极大似然估计 $\hat{\theta}_2$; 并分别计算相应的估计值。
- (2) $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否是无偏的? 若否, 请修正。
- (3) 请问修正后的估计那个更有效?

四. (10分) 简· 奥斯汀(1775 - 1817), 英国女作家, 作品有: 《理智与情感》, 《傲慢与偏见》, 《爱玛》等, 在其身后, 她的哥哥亨利主持了遗作《劝导》和《诺桑觉寺》两部作品出版。下面表格收集了代表作《理智与情感》, 《爱玛》以及《劝导》前两章中常用代表词的出现频数,

单词	理智与情感	爱玛	劝导
a	147	186	184
an	25	26	40
this	32	39	30
that	94	105	59

请问作品《理智与情感》, 《爱玛》以及《劝导》之间在选择常用词比例是否存在差异? ($\alpha = 0.05$)

五. (15分) 为比较甲和乙两处矿石的含灰率(%), 分别从甲、乙两处随机抽取矿石6块, 甲处矿石含灰率数据是: 17, 14, 18, 13, 19 和15; 而乙处矿石含灰率数据为: 16, 19, 20, 22, 18 和19. 假设两处矿石含灰率分别服从正态分布, 且总体独立, 均值和方差未知. 试根据以上数据判断:

- (1)(6 分) 在显著水平0.05下, 甲、乙两处矿石含灰率的方差是否相等?
- (2)(9 分) 在显著水平0.05下, 乙处矿石含灰率的平均量是否显著地高于甲处矿石含灰率的平均量?

附录 分位数: $u_{0.025} = 1.960$, $u_{0.05} = 1.645$, $t_{0.025}(10) = 2.228$, $t_{0.05}(10) = 1.812$, $t_{0.025}(11) = 2.201$, $t_{0.05}(11) = 1.796$, $t_{0.025}(12) = 2.178$, $t_{0.05}(12) = 1.782$, $\chi_{0.05}^2(1) = 3.841$, $\chi_{0.05}^2(2) = 5.991$, $\chi_{0.05}^2(6) = 12.591$, $F_{0.05}(5, 5) = 5.050$, $F_{0.025}(5, 5) = 7.146$, $F_{0.05}(6, 6) = 4.284$, $F_{0.025}(6, 6) = 5.820$.

中国科学技术大学

2018—2019学年第二学期考试试卷答案

一. 简答(写出简要步骤)

1. (6分) 解: 设 X 表示随机抽取一件产品为次品的事件, A 和 B 分别表示产品是由甲, 乙工厂生产的事件, 则 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.4$, $P(X|A) = 0.01$, $P(X|B) = 0.02$. 于是有

$$P(X) = P(X|A)P(A) + P(X|B)P(B) = 0.014.$$

那么随机抽取一件, 发现是次品, 而该次品是 A 厂生产的概率是:

$$P(A|X) = \frac{P(X|A)P(A)}{P(X)} = \frac{3}{7}.$$

2. (6分) 解: 二月份该公司有 k 个索赔成功的概率是:

$$\sum_{n=k}^{\infty} \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda p}}{k!}.$$

若该月份有 k 个索赔成功, 则它受理了 m ($m \geq k$)个索赔事件的概率是:

$$\frac{C_m^k p^k (1-p)^{m-k} \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}}{\sum_{n=k}^{\infty} \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}} = \frac{(\lambda(1-p))^{m-k} e^{-(\lambda(1-p))}}{(m-k)!}$$

3. (6分) 解: 由犯第一类错误和犯第二类错误的定义可知, 犯第一类错误的概率为

$$P(X > 1/2 | \theta = 5) = \int_{1/2}^1 (1+5)x^5 dx = 1 - \frac{1}{2^6} = 0.984375;$$

犯第二类错误的概率为

$$P(X < 1/2 | \theta = 3) = \int_0^{1/2} (1+3)x^3 dx = \frac{1}{2^4} = 0.0625.$$

4. (6分) 解: μ 的置信水平为0.95的置信区间为 $[\bar{x} - u_{0.025}/\sqrt{n}, \bar{x} + u_{0.025}/\sqrt{n}]$, 即

$$[40 - \frac{1.96}{4}, 40 + \frac{1.96}{4}] = [39.51, 40.49].$$

5. (8分) 解:

$$E\left(\frac{X_1}{\sum_{i=1}^n X_i}\right) = \frac{1}{n}.$$

6. (8分) 解: 设发生故障的设备数为 X 和维修工人人数为 k , 则 $X \sim B(300, 0.01)$, 由题意可知

$$P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k C_{300}^i 0.01^i 0.99^{300-i} \geq 0.99$$

由泊松分布近似可知

$$P(X \leq k) \approx \sum_{i=0}^k \frac{3^i}{i!} e^{-3} \geq 0.99$$

计算可知, $k = 8$, 至少需配备8工人, 才能保证设备发生故障但不能及时维修的概率小于0.01.

注: 此题也可以用正态分布近似计算 $k = 8$.

二. (20分) 解:

(1) (ξ, η) 的联合密度为 $p(x, y) = 2, 0 < x \leq y < 1; p(x, y) = 0$, 其它.

(2) ξ 的边缘密度 $p_1(x) = \int_x^1 2dy = 2(1-x), 0 < x < 1;$

η 的边缘密度 $p_2(y) = \int_0^y 2dx = 2y, 0 < y < 1.$

(3) 当 $0 < y < 1$ 时, 条件密度 $p(x|\eta = y) = \frac{p(x,y)}{p_2(y)} = \frac{1}{y}, 0 < x \leq y.$

(4) $E(\xi|\eta = y) = \int_0^y xp(x|\eta = y)dx = \int_0^y \frac{x}{y}dx = \frac{y}{2}.$

三. (15分)解:

(1) 由 $E(X) = 0 \times \frac{\theta}{4} + 1 \times (1 - \theta) + 2 \times \frac{3\theta}{4} = 1 + \frac{\theta}{2}$ 可得,

$$\hat{\theta}_1 = 2(\bar{X} - 1),$$

其中 $\bar{X}$ 是样本均值. 代入观测数据可知, $\hat{\theta}_1 = 0.66$.

令 n_i 表示样本中取值为 i 的个数, $i = 0, 1, 2$, 则样本量 $n = n_0 + n_1 + n_2$. 那么似然函数为

$$L(\theta) = \left(\frac{\theta}{4}\right)^{n_0} (1 - \theta)^{n_1} \left(\frac{3\theta}{4}\right)^{n_2}.$$

于是, 解方程

$$\frac{\partial \log(L(\theta))}{\partial \theta} = \frac{n_0}{\theta} - \frac{n_1}{1 - \theta} + \frac{n_2}{\theta} = 0,$$

得到

$$\hat{\theta}_2 = \frac{n - n_1}{n}.$$

代入观测数据可知, $\hat{\theta}_2 = 0.67$.

(2) $E(\hat{\theta}_1) = E(2(\bar{X} - 1)) = 2(E(\bar{X}) - 1) = 2(E(X) - 1) = \theta$, 由此可知 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计. $E(\hat{\theta}_2) = E\left(\frac{n - n_1}{n}\right) = \frac{n - E(n_1)}{n} = \frac{n - n(1 - \theta)}{n} = \theta$, 所以 $\hat{\theta}_2$ 也是 θ 的无偏估计.

(3) $E(X^2) = 0 \times \frac{\theta}{4} + 1 \times (1 - \theta) + 4 \times \frac{3\theta}{4} = 1 + 2\theta$, 则 $Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 =$

$1 + 2\theta - (1 + \frac{\theta}{2})^2 = \theta - \frac{\theta^2}{4}$. 因此,

$$Var(\hat{\theta}_1) = Var(2(\bar{X} - 1)) = 4Var(\bar{X}) = 4Var(X)/n = \frac{4\theta - \theta^2}{n}.$$

很容易算出 $Var(n_1) = n(1 - \theta)\theta$, 则

$$Var(\hat{\theta}_2) = Var(\frac{n - n_1}{n}) = \frac{Var(n_1)}{n^2} = \frac{\theta - \theta^2}{n}.$$

因为 $Var(\hat{\theta}_2) < Var(\hat{\theta}_1)$, 所以估计 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效.

四. (10分) 解: 设原假设为: 作品《理智与情感》,《爱玛》以及《劝导》之间在选择常用词比例没有差异. 在原假设下,《理智与情感》,《爱玛》以及《劝导》选择常用词比例的期望值为 那么, 检验统计量为,

单词	理智与情感	爱玛	劝导
a	159.32368	190.33299	167.34333
an	28.04343	33.50155	29.45502
this	31.12513	37.18304	32.69183
that	79.50776	94.98242	83.50982

$$T = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{(n_{ij} - E(n_{ij}))^2}{E(n_{ij})} = 19.722,$$

自由度为6. 由于 $T > \chi_{0.05}^2(6) = 12.591$, 则拒绝原假设, 即作品《理智与情感》,《爱玛》以及《劝导》之间在选择常用词比例有显著差异.

五. (15分) 解: 分别用 X 和 Y 表示甲和乙两处矿石的含灰率, 且由题意知 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. 利用数据可得, $\hat{\mu}_1 = 16$, $\hat{\mu}_2 = 19$, $\hat{\sigma}_1^2 = 5.6$ 和 $\hat{\sigma}_2^2 = 4$.
(1) 假设检验问题为: $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \longleftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$. F 检验统计量为

$$F = \frac{\hat{\sigma}_1^2}{\hat{\sigma}_2^2} = 1.4,$$

自由度为(5, 5). 因为 $F_{0.025}(5, 5) = 7.146$ 和 $F_{0.975}(5, 5) = 1/F_{0.025}(5, 5) = 0.140$, 所以 $F_{0.975}(5, 5) < F < F_{0.025}(5, 5)$, 则接受原假设, 即甲和乙两处矿石的含灰率的方差相等.

(2) 假设检验问题为: $H_0: \mu_1 = \mu_2 \longleftrightarrow H_1: \mu_1 < \mu_2$. 记 $S_w^2 = (5\hat{\sigma}_1^2 + 5\hat{\sigma}_2^2)/10 = 4.8$, 两样本 t 检验统计量为

$$T = \frac{\hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2}{S_w \sqrt{1/6 + 1/6}} = -2.3717,$$

自由度为10. 因为 $t_{0.05}(10) = 1.812$, 所以 $T < -t_{0.05}(10)$, 则拒绝原假设, 即乙处矿石含灰率的平均量显著地高于甲处矿石含灰率的平均量.

中国科学技术大学

2019—2020学年第一学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计(B) 得分 _____

所在系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2020年1月13日上午8:30-10:30; 使用简单计算器

一、(30分, 每小题3分) 填空题或单选题, 答案可以直接写在试卷上.

- (1) 设 $P(A) = P(B) = 0.4$, 且 $P(B|A) + P(\overline{B}|\overline{A}) = 1$, 则 $P(AB) =$ _____.
- (2) 甲乙二人抛掷一枚均匀的硬币, 甲抛了101次, 乙抛了100次, 则甲抛出的正面次数比乙多的概率是_____.
- (3) 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}$, $x \in (-1, 1)$. 对任意 $x \in (-1, 1)$, 若在条件 $X = x$ 下, 随机变量 Y 的条件分布律为

$$P(Y = -\sqrt{1-x^2}) = P(Y = \sqrt{1-x^2}) = 1/2,$$

则 Y _____ 连续型随机变量, (X, Y) _____ 连续型随机向量. ()

(A) 是, 是 (B) 是, 不是 (C) 不是, 是 (D) 不是, 不是

- (4) 在单位圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上随机取两个点, 以随机变量 X 表示它们之间的距离, 则 $E(X^2) =$ _____.
- (5) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一列独立同分布的随机变量, 且均服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布. 记 $\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 且 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有()
 (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sqrt{n}}{\lambda}(\overline{X} - \lambda) \leq x\right) = \Phi(x)$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sqrt{\frac{n}{\lambda}}(\overline{X} - \lambda) \leq x\right) = \Phi(x)$
 (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sqrt{n}(\lambda \overline{X} - 1) \leq x\right) = \Phi(x)$ (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sqrt{n\lambda}(\overline{X} - \frac{1}{\lambda}) \leq x\right) = \Phi(x)$
- (6) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自标准正态总体的简单随机样本, 且 $1 \leq m < n$, 则当常数 $c =$ _____ 时, 统计量 $c(\sum_{i=1}^m X_i)^2 / \sum_{i=m+1}^n X_i^2$ 服从 F 分布.
- (7) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ 为已知常数, 记 $\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则下列统计量中与 $\overline{X}$ 不独立的是()
 (A) 样本标准差 S (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2$ (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (D) $X_1 - X_2$
- (8) 设 X_1, X_2, X_3 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则下列统计量中, () 为 μ 的无偏估计且方差最小.
 (A) $\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{6}X_3$ (B) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$
 (C) $\frac{1}{5}X_1 + \frac{2}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3$ (D) $\frac{1}{7}X_1 + \frac{2}{7}X_2 + \frac{3}{7}X_3$
- (9) 对一正态总体 $N(\mu, 100)$ 的均值 μ 求置信水平为 95% 的置信区间, 若要求其区间长度不大于 4, 则样本容量 n 至少应取_____.
- (10) 假设检验中, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下若原假设 H_0 被接受, 这说明()
 (A) 有充分的理由表明 H_0 是正确的 (B) 没有充分的理由表明 H_0 是错误的
 (C) 有充分的理由表明 H_1 是错误的 (D) 没有充分的理由表明 H_1 是正确的

二、(20分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一列独立的随机变量, 且均服从 $U(0, 1)$ 分布. 记

$$Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \quad Z = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

(1) 试证明: 对任意常数 $0 < y, z < 1$, 有

$$P(Y \leq y, Z \leq z) = \begin{cases} z^n - (z - y)^n, & y < z; \\ z^n, & y \geq z. \end{cases}$$

(2) 利用上述结果, 试求随机变量 Y 和 Z 的联合密度函数 $f(y, z)$.

(3) 在 $Y = y$ 条件下 ($0 < y < 1$), 试求 Z 的条件密度函数 $f_{Z|Y}(z|y)$.

(4) 若 $n = 2$, 试求 Y 和 Z 的协方差 $\text{Cov}(Y, Z)$.

三、(15分) 设随机变量 X, Y 和 Z 相互独立, 且均服从参数为 1 的指数分布. 记

$$U = \frac{X}{X+Y}, \quad V = \frac{X+Y}{X+Y+Z}, \quad W = X+Y+Z.$$

(1) 计算随机向量 (U, V, W) 的联合密度函数.

(2) 随机变量 U, V 和 W 是否相互独立? 请证明你的结论.

四、(15分) 设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t) = \begin{cases} 1 - \exp\{-(\frac{t}{\theta})^m\}, & t \geq 0; \\ 0, & t < 0, \end{cases}$

其中 $m > 0$ 为已知参数, 而 $\theta > 0$ 为未知参数. 随机取 n 个这种元件, 测得它们的使用寿命分别为 $T_1, T_2, \dots, T_n$. 记 $g(\theta) = \theta^m$.

(1) 试求 $g(\theta)$ 的极大似然估计 $\hat{g}(T_1, T_2, \dots, T_n)$.

(2) 上述估计是否为无偏估计? 请证明你的结论.

五、(12分) 经大量调查, 已知一般健康成年男子每分钟脉搏的次数服从正态分布 $N(72, 6^2)$. 现测得 16 例成年男子慢性铅中毒患者的脉搏平均 67 次/分钟, 标准差为 7 次/分钟. 问在显著性水平 0.05 下, 这群患者每分钟脉搏的次数(假设也服从正态分布)和正常人有无显著性差异? (要求对均值和方差都进行检验.)

六、(8分) 中国科学技术大学 2019 级本科新生入学考试中, 某学院两个班级的英语科目各档成绩(从低到高)人数如下表所示:

档次	I	II	III	IV	V	VI	合计
一班	8	27	10	6	8	6	65
二班	15	25	8	7	6	4	65

我们能否认为这两个班级的英语水平大致相当? 显著性水平设为 $\alpha = 0.05$.

附录:

$$\Phi(1.645) = 0.95, \quad \Phi(1.96) = 0.975;$$

$$t_{15}(0.025) = 2.131, \quad t_{15}(0.05) = 1.753, \quad t_{16}(0.025) = 2.12, \quad t_{16}(0.05) = 1.746;$$

$$\chi_5^2(0.95) = 1.145, \quad \chi_5^2(0.05) = 11.071, \quad \chi_{15}^2(0.975) = 6.262, \quad \chi_{15}^2(0.025) = 27.488.$$

参考答案

- 一. (1) 0.16 (2) 0.5 (3) B (4) 1 (5) C
(6) $\frac{n-m}{m}$ (7) C (8) B (9) 97 (若答 96 也算对) (10) B.

二. (1) 当 $0 < y, z < 1$ 时, 由 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布可知

$$\begin{aligned} P(Y \leq y, Z \leq z) &= P(Z \leq z) - P(Y > y, Z \leq z) \\ &= P(X_1 \leq z, \dots, X_n \leq z) - P(y < X_1 \leq z, \dots, y < X_n \leq z) \\ &= [P(X_1 \leq z)]^n - [P(y < X_1 \leq z)]^n. \end{aligned}$$

再由 $X_1 \sim U(0, 1)$ 即知

$$P(Y \leq y, Z \leq z) = \begin{cases} z^n - (z - y)^n, & y < z; \\ z^n, & y \geq z. \end{cases}$$

(2) 注意到联合密度函数 $f(y, z)$ 的取值范围是 $0 < y < z < 1$, 将 (1) 中联合分布函数 $P(Y \leq y, Z \leq z)$ 对变量 y 和 z 求一阶偏导数, 即得

$$f(y, z) = n(n-1)(z-y)^{n-2}, \quad 0 < y < z < 1.$$

(如果上述表达式正确, 但没有说明取值范围为 $0 < y < z < 1$, 扣 1-2 分.)

(3) 由 (2) 可知, 随机变量 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \int_y^1 f(y, z) dz = n(1-y)^{n-1}, \quad 0 < y < 1.$$

从而

$$f_{Z|Y}(z|y) = \frac{f(y, z)}{f_Y(y)} = \frac{(n-1)(z-y)^{n-2}}{(1-y)^{n-1}}, \quad y < z < 1.$$

(如果上述表达式正确, 但没有说明取值范围为 $y < z < 1$, 扣 1-2 分.)

(4) 当 $n = 2$ 时, 随机变量 Y 的密度函数为 $f_Y(y) = 2(1-y)$, $0 < y < 1$, 故

$$EY = \int_0^1 2y(1-y) dy = \frac{1}{3}.$$

类似地, 可求得随机变量 Z 的密度函数为 $f_Z(z) = 2z$, $0 < z < 1$, 及 $EZ = \frac{2}{3}$. 此外, 由于此时联合密度函数退化为 $f(y, z) = 2$, $0 < y < z < 1$, 我们有

$$E[YZ] = \int_0^1 \int_y^1 2yz dz dy = \frac{1}{4}.$$

所以,

$$\text{Cov}(Y, Z) = E[YZ] - EY \cdot EZ = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{36}.$$

三. (1) 由

$$u = \frac{x}{x+y}, \quad v = \frac{x+y}{x+y+z}, \quad w = x+y+z,$$

可得 $x = uvw$, $y = (1-u)vw$, $z = (1-v)w$, 从而Jacobi行列式

$$J = \begin{vmatrix} vw & uw & uv \\ -vw & (1-u)w & (1-u)w \\ 0 & -w & 1-v \end{vmatrix} = vw^2.$$

由 (X, Y, Z) 的联合密度函数 $f(x, y, z) = e^{-(x+y+z)}$, $x, y, z > 0$, 及密度变换公式可得所求随机向量 (U, V, W) 的联合密度函数为

$$p(u, v, w) = vw^2 e^{-w}, \quad 0 < u, v < 1, w > 0.$$

(如果上述表达式正确, 但没有说明取值范围, 扣 1-2 分.)

(2) 随机变量 U, V 和 W 相互独立. 事实上, 由上述联合密度函数可以分解为

$$p(u, v, w) = p_U(u)p_V(v)p_W(w)$$

即知该结论成立, 其中

$$p_U(u) = 1, \quad 0 < u < 1; \quad p_V(v) = 2v, \quad 0 < v < 1; \quad p_W(w) = \frac{1}{2}w^2 e^{-w}, \quad w > 0.$$

四. (1) 由总体 T 的概率密度函数为 $f(t) = \frac{mt^{m-1}}{\theta^m} \exp\{-(\frac{t}{\theta})^m\}$, $t \geq 0$, 故似然函数为

$$L(\theta) = \frac{m^n}{\theta^{mn}} \prod_{i=1}^n t_i^{m-1} \exp\left\{-\left(\frac{t_i}{\theta}\right)^m\right\}.$$

对其取对数, 得对数似然函数为

$$l(\theta) = \ln L(\theta) = C - n \ln(\theta^m) - \frac{1}{\theta^m} \sum_{i=1}^n t_i^m.$$

将上式对 θ^m 求导数, 并令其等于 0, 可得(也可对 θ 求导, 结果相同)

$$\frac{dl(\theta)}{d(\theta^m)} = -\frac{n}{\theta^m} + \frac{1}{\theta^{2m}} \sum_{i=1}^n t_i^m = 0.$$

解之即可得所求极大似然估计量为

$$\hat{g}(T_1, T_2, \dots, T_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i^m.$$

(2) 由

$$\begin{aligned} E[\hat{g}(T_1, T_2, \dots, T_n)] &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[T_i^m] = E[T^m] \\ &= \int_0^\infty \frac{mt^{2m-1}}{\theta^m} \exp\left\{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m\right\} dt = \theta^m \int_0^\infty xe^{-x} dx = \theta^m, \end{aligned}$$

可知, $\hat{g}(T_1, T_2, \dots, T_n)$ 是 $g(\theta)$ 的一个无偏估计.

五. (1) 均值的检验. $H_0: \mu = 72$, $\longleftrightarrow H_1: \mu \neq 72$. 由 t 检验统计量

$$t = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} = \frac{\sqrt{16}(67 - 72)}{7} = -2.857,$$

可知 $|t| > t_{15}(0.025) = 2.131$, 故应拒绝原假设, 即认为患者每分钟脉搏的平均次数与正常人有显著性差异.

(2) 方差的检验. $H_0: \sigma^2 = 6^2$, $\longleftrightarrow H_1: \sigma^2 \neq 6^2$. 由 χ^2 检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{15 \cdot 7^2}{6^2} = 20.417,$$

可知 $\chi_{15}^2(0.975) = 6.262 < \chi^2 < \chi_{15}^2(0.025) = 27.488$, 故应接受原假设, 即认为患者每分钟脉搏次数的方差与正常人相同. 结合均值和方差两个方面, 我们最终可认为患者每分钟脉搏的次数与正常人有显著性差异.

(注: 如果先进行方差的检验, 认定方差可以等于 6^2 , 然后利用一样本 u 检验也算正确答案, 均值的检验结果与上面相同.)

六. 拟合优度联列表齐一性检验. 原假设为两个班级的英语水平相当, 而其检验统计量为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^6 \frac{(nn_{ij} - n_{i \cdot} n_{\cdot j})^2}{nn_{i \cdot} n_{\cdot j}}.$$

代入数据计算可知, $\chi^2 = 3.1922 < \chi_5^2(0.05) = 11.071$, 故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下我们不能拒绝原假设, 即可认为两个班级的英语水平相当.

中国科学技术大学

2019—2020学年第二学期期末试卷

考试科目 概率论与数理统计B 得分 _____

院系 _____ 学号 _____ 姓名 _____

一. 填空题(每题3分, 共30分, 答案请写在答题纸上):

1. 若事件 A 和事件 B 相互独立, 已知 $P(B) = 0.3$, $P(\bar{A} \cup B) = 0.8$, 则 $P(A) =$ _____.
2. 设随机变量 X 与 Y 独立, 且 $EX = EY = 0$, $VarX = VarY = 1$. 若记 $W_1 = X + Y$, $W_2 = X - Y$, 则 W_1 与 W_2 的相关系数为 _____.
3. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是相互独立的标准正态随机变量, 若要使得 $T = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 + 4X_4)^2$ 服从卡方分布, 则非零常数 a 和 b 的值应为 _____.
4. 随机抽查 9 辆从中国科大西校区到合肥南站的搭乘出租车所用的时间, 算得样本均值 $\bar{x} = 20$ (分钟), 无偏方差的标准差 $s = 3$ (分钟). 若假设此样本来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知, 则参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 _____.
5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 如分别用 $2X_2 - X_1, \bar{X}, X_1$ 作为 μ 的估计量时, 其中最有效的是 _____.
6. 某总体是一个离散分布, 它有 10 个不同的取值, 且其分布中含有 2 个未知参数. 若采用拟合优度检验判断一组简单随机样本是否服从该离散总体, 所使用的卡方检验统计量的自由度应为 _____.
7. 将数字 $1, 2, 3, \dots, n$ 任意排成一列, 定义 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个位置恰是数字 } i, \\ 0, & \text{第 } i \text{ 个位置不是数字 } i. \end{cases}$
令 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$. 则随机变量 Y 的数学期望为 _____.
8. 设 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = 3/7$, $P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = 4/7$, 则 $P(\max\{X, Y\} \geq 0) =$ _____.
9. 若 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是分布函数, 则以下函数中不一定是分布函数的为 _____.
(A) $F(x)G(x)$; (C) $aF(x) + (1-a)G(x)$, 其中, $0 < a < 1$;
(B) $[F(x)]^6[G(x)]^8$; (D) $bF(x) + \frac{1}{b}G(x)$, 其中, $b > 1$;
10. 在一次假设检验中, 下列说法正确的是 _____
(A) 既可能犯第一类错误也可能犯第二类错误.
(B) 如果备择假设是正确的, 但作出的决策是拒绝备择假设, 则犯了第一类错误.

(C)增大样本容量, 则犯两类错误的概率都不变.

(D)如果原假设是错误的, 但作出的决策是接受备择假设, 则犯了第二类错误.

二. (10分) 设市区某公寓楼有100户居民用电, 各户用电情况相互独立. 已知每户每日用电量 X_i (单位: 度) 服从区间 $[0, 12]$ 上的均匀分布, 请运用中心极限定理求这100户居民每日总用电量超过500度的概率. (结果可用标准正态分布函数 $\Phi(\cdot)$ 的值表示).

三. (15分) 设随机变量 X 和 Y 独立同分布于参数为 1 的指数分布, 他们的密度函数为 $f(x) = e^{-x}, x > 0$. 记 $U = X + Y$, $V = X/(X + Y)$.

(1) 求随机向量 (U, V) 的联合密度;

(2) 分别求出随机变量 X 和 Y 的边缘密度, 并判断随机变量 U 和 V 是否相互独立.

四. (20分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自于均匀分布总体 $U(0, \theta)$ 的一个样本容量为 n 的简单随机样本。

(1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$;

(2) 验证 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否具有无偏性, 若为有偏估计请将其修正为无偏估计.

五. (15分) 为了解甲、乙两家企业基层职工的工资水平, 分别从两家企业各随机抽取若干名基层职工进行调查, 得如下月收入数据 (单位: 元):

甲企业: 2800, 3100, 2900, 2900, 3200, 3100, 3000

乙企业: 3000, 2900, 3100, 2800, 3200, 3600, 3900, 3100

设两家企业基层职工工资分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$, 两个总体独立且均值和方差皆未知. 试根据以上数据检验: 甲企业基层职工平均工资是否低于乙企业基层职工平均工资? (显著性水平 $\alpha = 0.05$)

六. (10分) 为了解男性和女性对三种类型的啤酒: 淡啤酒、普通啤酒和黑啤酒的偏好有没有差异, 分别调查了180位男士和120位女士的喜好, 得如下数据

	淡啤酒	普通啤酒	黑啤酒
男性	49	31	100
女性	51	20	49

请问男性和女性对这三种类型的啤酒的偏好有显著差异吗? ($\alpha = 0.05$)

附录: 参考分位数的数值如下:

$u(0.05) = 1.64, u(0.025) = 1.96, t_8(0.05) = 1.86, t_8(0.025) = 2.30, t_9(0.05) = 1.83, t_9(0.025) = 2.26, t_{13}(0.05) = 1.77, t_{13}(0.025) = 2.16, t_{14}(0.05) = 1.76, t_{14}(0.025) = 2.15, t_{15}(0.05) = 1.75, t_{15}(0.025) = 2.13, \chi_2(0.05) = 5.99, \chi_2(0.025) = 7.38, \chi_5(0.05) = 11.07, \chi_5(0.025) = 12.83, \chi_6(0.05) = 12.59, \chi_6(0.025) = 14.45.$

中国科学技术大学
2020—2021学年第一学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计(B) 得分 _____

所在院系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2021 年 3 月 6 日上午 8:30–10:30; 可使用简单计算器

一、(30分, 每小题3分) 填空题或单选题, 答案可以直接写在试卷上.

- (1) 设 A, B 为随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 下列为假命题的是()
- (A) 若 $P(A|B) = P(A)$, 则 $P(A|\bar{B}) = P(A)$
(B) 若 $P(A|B) > P(A)$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$
(C) 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 则 $P(A|B) > P(A)$
(D) 若 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B)$, 则 $P(A) > P(B)$
- (2) 设平面上有 n 个点, 编号分别为 $1, 2, \dots, n$. 现一质点在此点集上做随机游动, 每次它在一点上停留片刻后就会在其余各点中随机地选择一个并移动到该点上. 已知其初始位置为点 1, 则它在第一次返回点 1 之前访问过点 2 的概率是_____.
- (3) 设随机变量 X 服从参数为 $0 < p < 1$ 的几何分布, 且在条件 $X = k$ 下, Y 服从参数为 k 的指数分布. 对任一实数 $y > 0$, 则 $P(Y > y) =$ ().
- (A) $e^{-y/p}$ (B) pe^{-y} (C) $p/(y+p)$ (D) $p/(e^y - 1 + p)$
- (4) 若随机变量 X 和 Y 满足 $P(X^2 + Y^2 = 2) = 1$, 则下列说法中一定不成立的是()
- (A) (X, Y) 为连续型随机向量 (B) $P(X + Y = 0) = 1/2$
(C) $EX = EY = 0$ (D) X 和 Y 相互独立
- (5) 设 X 和 Y 为相互独立的标准正态随机变量, 则 $P(\max\{X, Y\} \geq 0) =$ _____.
- (6) 设随机变量 X 和 Y 分别服从参数为 λ 和 μ 的 Poisson 分布, 且相互独立. 对任一非负整数 n , 则条件期望 $E[X|X + Y = n] =$ _____.
- (7) 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(a, a; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $\text{Cov}(X, XY^2) =$ _____.
- (8) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 且 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$. 已知 $T = c(X_{n+1} - \bar{X})/\sqrt{m_2}$ 服从 t 分布, 则 $c =$ _____.
- (9) 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 未知, 若样本容量 n 和置信水平 $1 - \alpha$ 均保持不变, 对不同的样本观察值, 则总体均值 μ 的置信区间长度()
- (A) 与样本均值有关 (B) 与 μ 本身有关 (C) 保持不变 (D) 不确定
- (10) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为其样本均值, $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数. 考虑假设检验问题: $H_0: \mu \leq 10 \leftrightarrow H_1: \mu > 10$. 若其拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 则当 $\mu = 11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为()
- (A) $1 - \Phi(0.5)$ (B) $1 - \Phi(1)$ (C) $1 - \Phi(1.5)$ (D) $1 - \Phi(2)$

二、(10分) 设有两个罐子, 一罐中有 m 个红球和 n 个黑球, 另一罐中有 n 个红球和 m 个黑球, 且 $m > n$. 某人随机选取一个罐子并从中随机抽取一球, 发现为红球. 现将该球放回原罐后并摇匀, 然后再次在此罐中随机抽取一球, 则它仍为红色的概率是否比 $1/2$ 大? 通过计算事件的概率来证明你的结论.

三、(20分) 将区间 $(0, 2)$ 随机截成两段, 记较短一段的长度为 X , 较长一段的长度为 Y .

(1) 求 X 和 Y 的相关系数 $\text{Corr}(X, Y)$;

(2) 求 X 的概率密度函数 $f(x)$;

(3) 求 $Z = \frac{Y}{X}$ 的概率密度函数 $g(z)$;

(4) 设随机变量 X^* 与 X 独立同分布, 试求 $V = 2|X - X^*|$ 的概率密度函数 $h(v)$.

四、(16分) 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = (\theta + 1)x^\theta$, $0 < x < 1$, 其中 $\theta > -1$ 为一未知参数. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一组简单随机样本.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(2) 求 $g(\theta) = \frac{1}{\theta+1}$ 的极大似然估计量 $\hat{g}$;

(3) 问 $\hat{g}$ 是否为 $g(\theta)$ 的一个无偏估计? 证明你的结论.

(4) 求常数 b , 使得对任意实数 x , 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\sqrt{n}(\hat{g} - g(\theta))/b \leq x) = \Phi(x)$ 成立, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数.

五、(14分) 在 1970 年代后期, 人们发现酿造啤酒时麦芽干燥的过程中会形成致癌物质亚硝基二甲胺(NDMA). 在 1980 年代初期为此开发了一种新麦芽干燥工艺. 独立地随机抽查了新旧工艺下各一组样本, 得到NDMA含量(以10亿份中的份数计)的结果如下:

旧工艺	6	4	5	5	6	5	5	6	4	6	7	4
新工艺	2	1	2	2	1	0	3	2	1	0	1	3

设旧、新工艺下的两样本均来自正态总体. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下,

(1) 是否可以认为两个总体的方差相等?

(2) 是否可以认为旧工艺下NDMA平均含量比新工艺下显著地大 3?

六、(10分) 某种鸟在起飞前, 双足齐跳的次数 X 服从参数为 p 的几何分布, 即其分布律为 $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$, $k = 1, 2, \dots$. 某人观测 130 次后, 获得一组样本如下:

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	≥ 13
频数	48	31	20	9	6	5	4	2	1	1	2	1	0

(1) 求 p 的最大似然估计值(精确到小数点后三位);

(2) 在拟合优度检验中频数一般不能小于 5, 故需将上述所有 $k \geq 7$ 情形下的频数进行合并, 此时请检验假设“ X 服从几何分布”是否成立(显著性水平 $\alpha = 0.05$).

附录: $t_{22}(0.025) = 2.074$, $t_{22}(0.05) = 1.717$, $t_{23}(0.025) = 2.069$, $t_{23}(0.05) = 1.714$

$F_{11,11}(0.025) = 3.474$, $F_{11,11}(0.05) = 2.818$, $F_{12,12}(0.025) = 3.277$, $F_{12,12}(0.05) = 2.687$

$\chi_5^2(0.05) = 11.071$, $\chi_5^2(0.95) = 1.145$, $\chi_6^2(0.05) = 12.592$, $\chi_6^2(0.95) = 1.635$

参考答案

- 一. (1) D (2) $\frac{n}{2(n-1)}$ (3) D (4) A (5) $\frac{3}{4}$ (6) $\frac{n\lambda}{\lambda+\mu}$ (7) $(a^2 + \sigma^2)\sigma^2$ (8) $\sqrt{\frac{n-1}{n+1}}$
(9) D (10) B

- 二. 以 A 表示选取的罐子为甲罐 (m 红 n 黑) 的事件, B 表示第一次取出的球为红球的事件, 则由 Bayes 公式可知

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c)} = \frac{m}{m+n}.$$

再由全概率公式可知, 第二次抽取的球仍为红色的概率为

$$\frac{m}{m+n}P(A|B) + \frac{n}{m+n}P(A^c|B) = \frac{m^2 + n^2}{(m+n)^2} > \frac{1}{2}.$$

- 三. (1) 由 $P(X+Y=2)=1$ 立知 $\text{Corr}(X, Y) = -1$.

- (2) 设随机变量 $U \sim U(0, 2)$, 而 X 取值范围为 $(0, 1)$, 故对任意 $0 < x < 1$,

$$P(X \leq x) = P(U \leq x) + P(2 - U \leq x) = \frac{x}{2} + \frac{x}{2} = x,$$

即 $X \sim U(0, 1)$. 故 X 的概率密度函数 $f(x) = 1, 0 < x < 1$.

- (3) 易知 $Z = \frac{Y}{X} = \frac{2-X}{X}$ 及 $X = \frac{2}{Z+1}$, 由 (2) 和密度变换公式可知 $g(z) = \frac{2}{(z+1)^2}, z > 1$.

- (4) 利用密度变换公式或者几何概型, 可知 V 的概率密度函数为

$$h(v) = \begin{cases} v, & 0 < v \leq 1; \\ 2-v, & 1 < v < 2. \end{cases}$$

注: 若上述密度函数表达式中变量范围缺乏或不正确, 按每处扣分.

- 四. (1) 由 $EX = \frac{\theta+1}{\theta+2}$, 解方程 $\frac{\theta+1}{\theta+2} = \bar{X}$ 可知 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$.

- (2) 由题意, 似然函数 $L(\theta) = (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta$, 从而对数似然函数为

$$l(\theta) = \ln L(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

令 $\frac{dl(\theta)}{d\theta} = 0$, 可得 $\frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$. 由此可知, $g(\theta) = \frac{1}{\theta+1}$ 的极大似然估计量

$$\hat{g} = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i.$$

- (3) 记 $Y_i = -\ln X_i, i = 1, 2, \dots, n$, 则易知 $\{Y_i, 1 \leq i \leq n\}$ 独立同分布于参数为 $\theta+1$ 的指数分布, 由此即知 $E\hat{g} = \frac{1}{\theta+1}$. 故 $\hat{g}$ 是 $g(\theta)$ 的一个无偏估计.

- (4) 由上可知, $\hat{g}$ 可表示为一列独立同分布随机变量 $\{Y_i, 1 \leq i \leq n\}$ 的平均, 故由经典场合下的中心极限定理可知, 常数 $b = \sqrt{\text{Var}(Y_1)} = \frac{1}{\theta+1}$.

五. 先计算一些统计量的值. 旧工艺: $n_1 = 12$, $\bar{x} = 5.25$, $(n_1 - 1)S_1^2 = 10.25$; 新工艺: $n_2 = 12$, $\bar{y} = 1.5$, $(n_2 - 1)S_2^2 = 11$; $S_w^2 = 0.983^2$.

$$(1) H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

由

$$\frac{1}{3.474} = \frac{1}{F_{11,11}(0.025)} < \frac{S_1^2}{S_2^2} = 0.932 < F_{11,11}(0.025) = 3.474,$$

接受 H_0 , 即可以认为两个总体的方差相等.

$$(2) H_0: \bar{X} - \bar{Y} \leq 3 \leftrightarrow H_1: \bar{X} - \bar{Y} > 3.$$

由

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - 3}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = 1.867 > t_{22}(0.05) = 1.717,$$

拒绝 H_0 , 即可以认为旧工艺下NDMA平均含量比新工艺下显著地大 3.

六. (1) 对几何分布总体, 易知其参数 p 的极大似然估计值为

$$\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}} = \frac{130}{363} = 0.358.$$

(2) 合并后的数据为

k	1	2	3	4	5	6	≥ 7
频数	48	31	20	9	6	5	11

从而检验统计量

$$\begin{aligned} \chi^2 &= \frac{(48 - 130 \times \hat{p})^2}{130 \times \hat{p}} + \frac{[31 - 130 \times \hat{p}(1 - \hat{p})]^2}{130 \times \hat{p}(1 - \hat{p})} + \cdots + \frac{[11 - 130 \times (1 - \hat{p})^6]^2}{130 \times (1 - \hat{p})^6} \\ &= 1.868 < \chi_5^2(0.05) = 11.071. \end{aligned}$$

故接受原假设.

中国科学技术大学
2021—2022学年第一学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计 得分 _____

所在院系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2022 年 1 月 12 日上午 8:30–10:30; 可使用简单计算器

一、(30分, 每小题3分) 填空题或单选题, 答案可以直接写在试卷上.

- (1) 设将ABC三个字母之一输入某信道, 独立地输出结果为原字母的概率是 0.8, 而输出为其它一字母的概率都是 0.1. 现等可能地将字母串AAAA, BBBB和CCCC之一输入该信道, 若已知输出结果为ABCA, 则输入的结果为AAAA的概率是_____.
- (2) 设 A, B, C 三个事件两两独立, 则它们相互独立的充分必要条件是()
(A) A 与 $B \cap C$ 独立 (B) $A \cap B$ 与 $A \cup C$ 独立
(C) $A \cap B$ 与 $A \cap C$ 独立 (D) $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立
- (3) 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, Y 服从参数为 0.5 的 Bernoulli 分布, 且相互独立, 则 $Z = XY$ 的分布函数的间断点个数为()
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- (4) 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 则对任一正整数 n , 概率 $P(X^n + Y > 1) =$ _____.
- (5) 设在单位正方形内部随机取一点, 然后以该点为圆心画一个单位圆, 若以 X 表示落在该圆内正方形顶点的个数, 则 $EX =$ _____.
- (6) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数 $\lambda = 3$ 的指数分布总体的一组简单随机样本, 若对任一 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - a| \geq \varepsilon) = 0$ 成立, 则常数 $a =$ ()
(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{2}{9}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{4}{9}$
- (7) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自标准正态总体的一组简单随机样本, 且记统计量 $Y = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{10} X_i^2 + \sum_{i=1}^5 X_{2i-1} X_{2i}$, 则 Y 的分布为()
(A) χ_4^2 (B) χ_5^2 (C) χ_9^2 (D) χ_{10}^2
- (8) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀总体 $U(\theta, 2\theta)$ 的一组简单随机样本, 其中 $\theta > 0$ 为一未知参数, 则 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 为 θ 的()
(A) 矩估计 (B) 极大似然估计 (C) 无偏估计 (D) 相合估计
- (9) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{36}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 8)$ 的一组简单随机样本, 且记 $\bar{X}$ 为样本均值. 若以区间 $[\bar{X} - 1, \bar{X} + 1]$ 作为 μ 的置信区间, 则其置信水平为_____.
- (10) 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2 \end{pmatrix}$ 的一组简单随机样本, 若假设检验 $H_0: \theta = 0.1 \leftrightarrow H_1: \theta = \theta_1$ 的拒绝域为 $\{X_1 = X_2 = X_3 = 1\}$, 其中 $0.5 < \theta_1 < 1$ 是一个给定的常数, 则此检验犯第二类错误的概率为_____.

二、(20分) 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 而对任一实数 x , 在 $X = x$ 条件下, $Y \sim N(x, 1)$.

(1) 试求随机变量 Y 的密度函数 $f_Y(y)$, 并指出 Y 服从何种分布.

(2) 试求条件期望 $E[XY|X = x]$.

(3) 试求 X 和 Y 的相关系数.

(4) 试求常数 a , 使得随机变量 $aX + Y$ 和 $aX - Y$ 相互独立.

三、(15分) 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立且都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

(1) 若随机变量 $Y = -a \ln X_1$, 其中 $a > 0$ 为一给定常数, 试求 Y 的概率密度函数.

(2) 试求随机变量 $Z = X_2/X_1$ 的分布函数.

(3) 试求随机变量 $U = 1/(X_1 X_2 X_3)$ 的概率密度函数.

四、(20分) 设一系列随机变量 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 满足

$$Y_i = \beta x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为给定非负常数且不全相等, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 而 β 和 σ^2 为两个未知参数.

(1) 根据 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 的分布, 请写出似然函数 $L(\beta, \sigma^2)$.

(2) 试求 β 的极大似然估计量 $\hat{\beta}$, 并证明 $\hat{\beta}$ 为 β 的一个无偏估计.

(3) 证明 $\hat{\beta}^* = \sum_{i=1}^n Y_i / \sum_{i=1}^n x_i$ 也为 β 的一个无偏估计, 并比较 $\hat{\beta}$ 和 $\hat{\beta}^*$ 哪个更有效.

五、(15分) 在 2021 年日本东京举行的第 32 届夏季奥运会中, 我国运动员杨倩和杨皓然获得了射击混合双人团体 10 米气步枪金牌. 决赛中 15 轮射击结果如下(单位: 环):

杨倩	10.5	9.7	10.0	10.5	10.3	10.2	10.1	10.6	10.4	9.9	10.8	10.8	10.4	10.4	10.4
杨皓然	10.3	10.4	10.9	10.2	10.5	10.4	10.2	10.8	10.6	10.0	10.5	10.7	10.4	10.1	10.7

设两位运动员的每次射击结果相互独立, 且均服从正态分布. 利用你所学的统计知识并结合上述决赛数据, 回答如下问题 (显著性水平 $\alpha = 0.05$):

(1) 两位运动员在比赛中射击成绩的方差是否可以认为是相等的?

(2) 假设“杨皓然平均射击水平高于杨倩”是否显著成立?

附录

标准正态分布函数: $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(2.121) = 0.983$

上分位数: $t_{28}(0.025) = 2.048$, $t_{28}(0.05) = 1.701$, $F_{14,14}(0.025) = 2.979$, $F_{14,14}(0.05) = 2.484$

(完)

参考答案

一、 每小题 3 分.

$\frac{4}{5}$; A; B; $\frac{1}{n+1}$; π ; B; B; D; 0.966; $1 - \theta_1^6$.

二、 每小题 5 分.

(1) 由

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}},$$

可知随机向量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + (y-x)^2}{2}}.$$

从而, 随机变量 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{4}},$$

即 Y 服从正态分布 $N(0, 2)$. [没指明具体分布扣 1 分.]

(2) 由题目条件, $E[XY|X=x] = xE[Y|X=x] = x^2$.

(3) 由 (1) 知 $\text{Var}(Y) = 2$, 而由 (2) 知 $E[XY] = E[E(XY|X)] = E[X^2] = 1$. 从而,

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)}} = \frac{E[XY]}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

(4) 易知, $(aX + Y, aX - Y)$ 服从二维正态分布, 且 $\text{Cov}(aX + Y, aX - Y) = a^2 - 2$.
由于二维正态随机向量的不相关性和独立性等价, 故所求常数 $a = \pm\sqrt{2}$.

三、 每小题 5 分.

(1) 对任一 $y > 0$, 由于

$$P(Y \leq y) = P(-a \ln X_1 \leq y) = P(X_1 \geq e^{-y/a}) = 1 - e^{-y/a},$$

故 Y 服从参数为 $1/a$ 的指数分布, 从而其概率密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} e^{-\frac{y}{a}}, \quad y > 0. \quad [\text{缺少或写错取值范围扣 2 分.}]$$

(2) 将 (X_1, X_2) 视为单位正方形上的均匀分布, 利用几何概型可知, 当 $0 \leq z < 1$ 时,

$$P(Z \leq z) = P(X_2 \leq zX_1) = z/2;$$

而当 $z \geq 1$ 时,

$$P(Z \leq z) = P(X_2 \leq zX_1) = 1 - 1/(2z).$$

故 Z 的分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0; \\ z/2, & 0 \leq z < 1; \\ 1 - 1/(2z), & z \geq 1. \end{cases}$$

[漏了 $z < 0$ 的部分扣 1 分.]

- (3) (此小题也可用其它方法计算, 但稍繁) 由 $V := \ln U = -\sum_{i=1}^3 \ln X_i$ 及 (1) 可知, V 为 3 个独立 $\text{Exp}(1)$ 随机变量之和, 故 V 服从 $\Gamma(1, 3)$ 分布, 即其概率密度函数为

$$f_V(v) = \frac{1}{2}v^2e^{-v}, \quad v > 0.$$

再由 $U = e^V$ 及密度函数变换公式可知, U 的概率密度函数为

$$f_U(u) = \frac{\ln^2 u}{2u^2}, \quad u > 1. \quad [\text{缺少或写错取值范围扣 2 分.}]$$

四、第 1 小题 4 分, 后面两个小题都涉及两个结论, 各 8 分.

- (1) 由 $Y_i \sim N(\beta x_i, \sigma^2), i = 1, 2, \dots, n$ 及它们相互独立可知,

$$L(\beta, \sigma^2) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^n} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i)^2 \right\}.$$

- (2) 记对数似然函数 $l(\beta, \sigma^2) = \ln L(\beta, \sigma^2)$, 并令 $\frac{\partial l}{\partial \beta} = 0$ 可得, $\sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i)x_i = 0$, 即 β 的极大似然估计量为

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i Y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

由 $\hat{\beta}$ 为一列独立正态随机变量的线性组合, 故 $\hat{\beta}$ 也服从正态分布, 且其期望和方差为

$$E(\hat{\beta}) = \frac{\sum_{i=1}^n \beta x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \beta, \quad \text{Var}(\hat{\beta}) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

从而 $\hat{\beta}$ 为 β 的一个无偏估计.

- (3) 与 $\hat{\beta}$ 类似, 估计量 $\hat{\beta}^*$ 也是一列独立正态随机变量的线性组合, 且

$$E(\hat{\beta}^*) = \frac{\sum_{i=1}^n \beta x_i}{\sum_{i=1}^n x_i} = \beta, \quad \text{Var}(\hat{\beta}^*) = \frac{n\sigma^2}{(\sum_{i=1}^n x_i)^2}.$$

故 $\hat{\beta}^*$ 也为 β 的一个无偏估计, 且由 Cauchy-Schwarz 不等式可知, 当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等时, $\text{Var}(\hat{\beta}) < \text{Var}(\hat{\beta}^*)$, 从而 $\hat{\beta}$ 更有效.

五、先做一些计算. 杨倩: $n_1 = 15, \bar{x} = 10.333, (n_1 - 1)S_1^2 = 1.353$; 杨皓然: $n_2 = 15, \bar{y} = 10.447, (n_2 - 1)S_2^2 = 0.957; S_w^2 = 0.287^2$. [上面的计算 3 分, 后面每小题各 6 分.]

- (1) $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \leftrightarrow H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

由

$$0.336 = \frac{1}{F_{14,14}(0.025)} < \frac{S_1^2}{S_2^2} = 1.414 < F_{14,14}(0.025) = 2.979,$$

接受 H_0 , 即可以认为他们的发挥稳定性相同.

- (2) $H_0: \mu_1 \geq \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 < \mu_2$.

由于

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = -1.08 > -t_{28}(0.05) = -1.701,$$

故接受 H_0 , 即不能认为杨皓然的比赛成绩显著高于杨倩.

中国科学技术大学
2021—2022学年第二学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计 得分 _____

所在院系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2022 年 6 月 13 日下午 14:30–16:30; 可使用简单计算器

一、(30分, 每小题3分) 填空题或单选题, 答案可以直接写在试卷上.

(1) 抛掷一枚均匀的硬币 n 次, 已知出现正面的次数为 k , 则第 1 次抛掷结果为正面的概率是_____.

(2) 已知随机变量 X 和 Y 满足

$$P(X = 1) = p_1, \quad P(\max\{X, Y\} = 1) = p_2, \quad P(\min\{X, Y\} = 1) = p_3,$$

则 $P(Y = 1) =$ _____.

(3) 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0; 1, 1; 0)$, 则 $E[\sqrt{X^2 + Y^2}] =$ _____.

(4) 设 X 和 Y 为随机变量, $Y \sim N(2, 2)$, 且满足 $E[X|Y] = Y^2$, 则 $EX =$ _____.

(5) 在任一三角形 $\triangle ABC$ 内部随机取一点记为 P , 然后在边 BC 上随机取一点记为 Q , 则直线 PQ 与边 AB 相交的概率为()

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{AB}{AB+AC}$ (C) $\frac{AB+\frac{1}{2}BC}{AB+AC+BC}$ (D) $\frac{AB^2}{AB^2+AC^2}$

(6) 设 X 和 Y 为两个独立的标准正态随机变量, 则 $(X+Y)^2/(X-Y)^2$ 的分布为()

(A) χ_1^2 分布 (B) $F_{1,1}$ 分布 (C) $F_{2,2}$ 分布 (D) 以上均不对

(7) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 其中 σ^2 已知, 且以 S^2 表示样本方差, 则()

(A) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi_n^2$ (B) $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$
(C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$ (D) $\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{\sigma}\right)^2 + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2$

(8) 设总体 X 的期望为 μ , 而 $\hat{\mu}_1$ 和 $\hat{\mu}_2$ 分别为 μ 的两个无偏估计量, 它们的方差分别为 1 和 2, 相关系数为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$. 若使 $\alpha\hat{\mu}_1 + \beta\hat{\mu}_2$ 也为 μ 的一个无偏估计且方差尽可能小, 则两常数之积 $\alpha\beta =$ _____.

(9) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本, 其中方差 σ^2 未知. 在置信水平 α 下, 设 μ 的置信区间为 $[\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2]$, 单侧置信下限和上限分别为 $\hat{\mu}_1^*$ 和 $\hat{\mu}_2^*$, 则下列关系中错误的是()

(A) $\hat{\mu}_1 < \hat{\mu}_1^*$ (B) $\hat{\mu}_2 > \hat{\mu}_2^*$ (C) $\hat{\mu}_2 - \hat{\mu}_1 = \hat{\mu}_2^* - \hat{\mu}_1^*$ (D) $\hat{\mu}_2 - \hat{\mu}_2^* = \hat{\mu}_1^* - \hat{\mu}_1$

(10) 现对正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中的参数 μ 进行假设检验, 若在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下接受了原假设 $H_0: \mu = \mu_0$, 则在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 下列说法正确的是()

(A) 依然接受 H_0 (B) 拒绝 H_0
(C) 可能接受或拒绝 H_0 (D) 犯第一类错误概率变大

二、(16分) 设随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = cx(y - x)e^{-y}, \quad 0 \leq x \leq y < \infty.$$

- (1) 求常数 c .
- (2) 分别求条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 和 $f_{Y|X}(y|x)$.
- (3) 求期望 $E[XY]$.
- (4) 求 X 和 Y 的相关系数 $\text{Corr}(X, Y)$.

三、(18分) 设随机变量 X 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, Y 服从均值为 2 的指数分布, 且它们相互独立.

- (1) 写出随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数 $f(x, y)$.
- (2) 求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $p(z)$.
- (3) 求关于 t 的一元二次方程 $t^2 + 2Xt + Y = 0$ 有实根的概率 (精确到小数点后 3 位).

四、(24分) 已知总体 X 服从 Pareto 分布, 即其概率密度函数为

$$f(x) = \frac{\alpha c^\alpha}{x^{\alpha+1}}, \quad x \geq c,$$

其中 $\alpha > 2, c > 0$ 为未知参数. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一组简单随机样本, 且分别以 $\bar{X}$ 和 S^2 表示样本均值和样本方差.

- (1) 分别求 α 和 c 的矩估计 $\hat{\alpha}_1$ 和 $\hat{c}_1$.
- (2) 分别求 α 和 c 的极大似然估计 $\hat{\alpha}_2$ 和 $\hat{c}_2$.
- (3) 估计量 $\hat{c}_2$ 是否为 c 的一个无偏估计? 若是, 证明之; 若否, 修正之.

五、(12分) 随机选取 8 个成人, 分别测量了他们在早晨起床时和晚上就寝时的身高 (单位: 厘米), 得到如下数据:

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
早晨(x_i)	172	168	180	181	160	163	165	177
晚上(y_i)	172	167	177	179	159	161	166	175

设成人身高服从正态分布, 能否认为成人早晨的身高显著高于晚上的身高 (显著性水平 $\alpha = 0.05$)?

附录 标准正态分布函数: $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$

上分位数: $t_7(0.025) = 2.365$, $t_7(0.05) = 1.895$, $t_{14}(0.025) = 2.145$, $t_{14}(0.05) = 1.761$

(完)

参考答案

一、 每小题 3 分.

$\frac{k}{n}$; $p_2 + p_3 - p_1$; $\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ (或 $\frac{1}{2}\sqrt{2\pi}$); 6; A; B; D; $\frac{3}{16}$; C; A.

二、 每小题 4 分.

(1) 由边缘概率密度函数 $f_X(x) = cxe^{-x}, x > 0$ 或 $f_Y(y) = \frac{c}{6}y^3e^{-y}, y > 0$, 即知 $c = 1$.

(2) 所求条件概率密度函数为[没写变量取值范围, 每处扣 1 分]

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = 6x(y - x)y^{-3}, \quad 0 \leq x \leq y;$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = (y - x)e^{x-y}, \quad x \leq y < \infty.$$

(3) 可由

$$E[XY] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xyf(x, y)dxdy = \int_0^{\infty} ye^{-y}dy \int_0^y x^2(y - x)dx$$

及 Γ 函数的性质直接计算得出 $E[XY] = 10$. 但这里提供另一种方法, 无需二重积分. 首先, 由第 1 小题中的边缘密度和 Γ 函数的性质直接可得

$$EX = 2, \quad \text{Var}(X) = 2; \quad EY = 4, \quad \text{Var}(Y) = 4.$$

另一方面, 由 (2) 中结论可知

$$E[Y|X = x] = \int_x^{\infty} y(y - x)e^{x-y}dy = x + 2,$$

亦即 $E[Y|X] = X + 2$. 由此可得,

$$E[XY] = E[E(XY|X)] = E[XE(Y|X)] = E[X^2] + 2EX = 10.$$

(4) 综上所述, $\text{Corr}(X, Y) = (10 - 2 \times 4) / \sqrt{2 \times 4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

三、 每小题 6 分.

(1) 所求答案为 $f(x, y) = \frac{1}{2}e^{-y/2}, 0 < x < 1, y > 0$. [没写变量取值范围扣 2 分.]

(2) [此小题方法有多种选择, 如直接利用卷积公式, 但必须注意变量的取值范围满足 $z - 1 \leq y \leq z, y > 0$, 故需对 z 进行分段讨论.] 所求答案为

$$p(z) = \begin{cases} 1 - e^{-z/2}, & 0 < z < 1; \\ (\sqrt{e} - 1)e^{-z/2}, & z \geq 1. \end{cases}$$

(3) 即求概率 $P(Y \leq X^2)$. 设 G 为由曲线 $y = x^2, x = 1$ 和 $y = 0$ 所围成的区域, 则

$$\begin{aligned} P(Y \leq X^2) &= \iint_G f(x, y)dxdy = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \frac{1}{2}e^{-y/2}dy \\ &= \int_0^1 \left(1 - e^{-\frac{x^2}{2}}\right)dx = 1 - \sqrt{2\pi}[\Phi(1) - \Phi(0)] \\ &= 0.145. \end{aligned}$$

四、 每小题 8 分.

(1) 首先, 可计算得

$$EX = \frac{\alpha c}{\alpha - 1}, \quad \text{Var}(X) = \frac{\alpha c^2}{(\alpha - 1)^2(\alpha - 2)}.$$

然后通过联立方程 $EX = \bar{X}$, $\text{Var}(X) = S^2$, 可得 α 和 c 的矩估计分别为

$$\hat{\alpha}_1 = 1 + \sqrt{1 + \bar{X}^2/S^2}, \quad \hat{c}_1 = \frac{\bar{X}\sqrt{1 + \bar{X}^2/S^2}}{1 + \sqrt{1 + \bar{X}^2/S^2}} \text{ 或 } \frac{\bar{X}\sqrt{\bar{X}^2 + S^2}}{S + \sqrt{\bar{X}^2 + S^2}}.$$

注: 在本小题中, 可将样本方差 S^2 替换成样本中心二阶矩 $m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.

(2) 首先, 可得似然函数为

$$L(\alpha, c) = \prod_{i=1}^n \frac{\alpha c^\alpha}{x_i^{\alpha+1}}, \quad c \leq x_1, x_2, \dots, x_n,$$

且由此可知参数 c 的极大似然估计为 $\hat{c}_2 = X_{(1)}$, 即 $\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$. 然后, 可求得对数似然函数为

$$l(\alpha, c) = n \ln \alpha + n\alpha \ln c - (\alpha + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

最后, 通过令 $\frac{\partial l(\alpha, c)}{\partial \alpha} = 0$, 可得 α 的极大似然估计为 $\hat{\alpha}_2 = n / \sum_{i=1}^n \ln(X_i/X_{(1)})$.

(3) 否. 通过计算可知估计量 $\hat{c}_2 = X_{(1)}$ 服从参数为 $n\alpha$ 和 c 的 Pareto 分布. 故由第 1 小问可知 $E[\hat{c}_2] = \frac{n\alpha c}{n\alpha - 1}$, 从而 $\hat{c}_2$ 不是 c 的无偏估计, 但可修正为 $\hat{c}_2^* = \frac{n\alpha - 1}{n\alpha} X_{(1)}$.

五、 成对数据检验, 且可认为成对数据之差来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$. 本题要求在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验 $H_0: \mu \leq 0 \leftrightarrow H_1: \mu > 0$. 对成对数据, 样本容量 $n = 8$, $\bar{x} - \bar{y} = 1.25$, $s = 1.2817$, 则由一样本 t 检验的检验统计量为

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s/\sqrt{n}} = 2.758 > t_7(0.05) = 1.895,$$

故拒绝原假设, 即认为“成人早晨的身高比晚上的身高要高”具有显著性.